


Diagnostisches Interview für Angststörungen und verwandte Störungen nach DSM-5 (ADIS-5)

Das ADIS-5 ist ein etabliertes halbstrukturiertes diagnostisches Interview, mit dem Psycholog:innen und andere klinische Fachkräfte Angststörungen und verwandte Störungen nach den Kriterien des DSM-5 erfassen. Es ermöglicht eine vertiefte Exploration von Symptomen, Differenzialdiagnose, Komorbiditäten, Vermeidung, subjektivem Leidensdruck und funktionellen Auswirkungen. Das in der spezialisierten klinischen Praxis und in der Forschung weit verbreitete Instrument hilft, verlässliche Diagnosen zu stellen, klinische Probleme zu priorisieren und Behandlungsentscheidungen auszurichten. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich die Durchführung an die vorliegenden Symptome anpassen, was es zu einem besonders geeigneten Instrument für die umfassende Diagnostik von Angststörungen bei Erwachsenen macht.

Anzahl der Fragen	120 Fragen
Geschätzte Dauer	90 Minuten
Sprache	Deutsch
Originalname	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Zielgruppe	Erwachsene
Autor:innen	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Kategorie	Angst

Vorschau der 120 Fragen

Abschnitt Panikstörung:

Sorge vor weiteren Panikattacken

0 - Keine | 1 | 2 - Leicht | 3 | 4 - Mäßig | 5 | 6 - Schwer | 7 | 8 - Sehr schwer

Abschnitt Panikstörung:

Situative Vermeidung

0 - Keine | 1 | 2 - Leicht | 3 | 4 - Mäßig | 5 | 6 - Schwer | 7 | 8 - Sehr schwer

Abschnitt Panikstörung:

Interozeptive Empfindlichkeit/Vermeidung

0 - Keine | 1 | 2 - Leicht | 3 | 4 - Mäßig | 5 | 6 - Schwer | 7 | 8 - Sehr schwer

Abschnitt Panikstörung:

Sicherheitssignale

0 - Keine | 1 | 2 - Leicht | 3 | 4 - Mäßig | 5 | 6 - Schwer | 7 | 8 - Sehr schwer

Abschnitt Panikstörung:

Ablenkung

0 - Keine | 1 | 2 - Leicht | 3 | 4 - Mäßig | 5 | 6 - Schwer | 7 | 8 - Sehr schwer

Führen Sie Ihre Fragebögen online durch

Senden Sie einen Link: Ihre Patient:innen antworten am Handy oder Computer, und Sie erhalten die ausgewerteten Ergebnisse per E-Mail.

Fragebogen auf mentaal.org ansehen ›

Auswertung und Interpretation

Die klinische Fachkraft führt ein halbstrukturiertes Interview, prüft für jede untersuchte Störung die diagnostischen Kriterien des DSM-5 und vergibt eine klinische Schweregradeinschätzung (Clinician Severity Rating, CSR) von 0 bis 8. Eine CSR von 4 oder höher gilt in der Regel als Hinweis auf eine klinisch bedeutsame Störung. Die Interpretation beruht auf dem Vorliegen der Kriterien, der Symptomintensität, der Chronizität, der Vermeidung, der Funktionsbeeinträchtigung und den Komorbiditäten. Die Anzahl der Fragen variiert je nach durchgeführten Modulen.

Nutzung

Dieses Testverfahren ist auf Mentaal nicht verfügbar. Um diesen Fragebogen in Ihrer Praxis zu verwenden, benötigen Sie eine gültige Nutzungslizenz. Wir empfehlen Ihnen, ihn direkt über die Website des Verlags zu versenden.

Zur Website des Verlags ›

Sind Sie Psycholog:in?

Mit Mentaal erhalten Sie aussagekräftige Informationen, um Ihre Patient:innen zu begleiten.

- Standardisierte Tests
- Automatische Auswertung
- Ergebnisse per E-Mail

Kostenlos testen | Alle Fragebögen ansehen

★★★★★

“Die automatische Auswertung spart mir enorm viel Zeit, und meine Patient:innen sind deutlich eher bereit, die Fragebögen auszufüllen.”

Samia T. - Online-Psychologin