

Ritvo-Autismus-Asperger-Diagnoseskala (RAADS-R)

Die RAADS-R ist eine Screening-Skala zur Unterstützung der Autismusdiagnostik bei Erwachsenen, insbesondere bei Personen mit Symptomen, die zu einem Asperger-Syndrom oder einer hochfunktionalen Autismus-Spektrum-Störung passen. Sie soll Schwierigkeiten in den Bereichen soziale Interaktion, Kommunikation, eingeschränkte Interessen und atypisches sensorisches Verhalten erkennen.

Anzahl der Fragen	80 Fragen
Geschätzte Dauer	20 Minuten
Sprache	Deutsch
Originalname	Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale
Zielgruppe	Erwachsene
Autor:innen	Riva Ariella Ritvo, Edward Ritvo, Thomas J. Guthrie, Irene S. Ritvo (2011)
Kategorie	Autismus-Spektrum

Vorschau der 80 Fragen

Ich halte mich für einen empathischen Menschen.

Trifft jetzt und traf auch früher zu | Trifft nur jetzt zu | Traf nur vor meinem 16. Lebensjahr zu | Traf nie zu

Im Gespräch verwende ich oft Wörter oder Ausdrücke, die ich aus Filmen, Serien oder dem Fernsehen übernommen habe.

Trifft jetzt und traf auch früher zu | Trifft nur jetzt zu | Traf nur vor meinem 16. Lebensjahr zu | Traf nie zu

Ich bin oft überrascht, wenn andere mir sagen, dass mein Verhalten unhöflich gewirkt haben könnte.

Trifft jetzt und traf auch früher zu | Trifft nur jetzt zu | Traf nur vor meinem 16. Lebensjahr zu | Traf nie zu

Ich spreche manchmal zu laut oder zu leise, ohne es zu merken.

Trifft jetzt und traf auch früher zu | Trifft nur jetzt zu | Traf nur vor meinem 16. Lebensjahr zu | Traf nie zu

Mir fällt es oft schwer zu wissen, wie ich mich in sozialen Situationen verhalten soll.

Trifft jetzt und traf auch früher zu | Trifft nur jetzt zu | Traf nur vor meinem 16. Lebensjahr zu | Traf nie zu

Führen Sie Ihre Fragebögen online durch

Senden Sie einen Link: Ihre Patient:innen antworten am Handy oder Computer, und Sie erhalten die ausgewerteten Ergebnisse per E-Mail.

Fragebogen auf mentaal.org ansehen ›

Auswertung und Interpretation

Auswertung

Jedes Item wird mit 0 bis 3 Punkten bewertet: „Trifft jetzt und in meiner Jugend zu“ = 3, „Trifft nur jetzt zu“ = 2, „Traf nur zu, als ich jünger als 16 war“ = 1, „Traf nie zu“ = 0. Die 17 Items, die in Richtung typischer Funktionsweise formuliert sind (1, 6, 11, 18, 23, 26, 33, 37, 43, 47, 48, 53, 58, 62, 68, 72, 77), werden umgepolt.

Der Gesamtwert reicht von 0 bis 240 und gliedert sich in vier Subskalen:

- Soziale Bezogenheit: 39 Items, 0 bis 117
- Umschriebene Interessen: 14 Items, 0 bis 42
- Sprache: 7 Items, 0 bis 21
- Sensomotorik: 20 Items, 0 bis 60

Interpretation des Gesamtwerts

- Unter 65: in der Regel nicht mit Autismus vereinbar
- 65 bis 105: einige autistische Merkmale, ohne ein Niveau, das eindeutig mit Autismus vereinbar ist
- 106 bis 139: in der Regel mit Autismus vereinbar; vertiefte diagnostische Abklärung angezeigt
- 140 und mehr: ausgeprägte autistische Merkmale; vertiefte diagnostische Abklärung angezeigt

Herkunft der Cut-off-Werte

- 65 ist der Cut-off-Wert aus der ursprünglichen Validierungsstudie (Ritvo et al., 2011: 201 autistische Erwachsene, 578 nicht autistische Erwachsene).
- 106 und 140 stammen aus der Überarbeitung durch NovoPsych (Hegarty et al., 2025). Sie wurden per ROC-Analyse an 37.620 Personen ermittelt, die die RAADS-R und den AQ ausgefüllt hatten, wobei die AQ-Cut-off-Werte (26 und 36) statt einer klinischen Diagnose als Kriterium dienten. Diese Arbeit ist ein technischer Bericht und nicht in einer begutachteten Fachzeitschrift erschienen.
- Die Cut-off-Werte der Subskalen stammen aus derselben Überarbeitung (vereinbar / ausgeprägt): soziale Bezogenheit 49 / 64, umschriebene Interessen 20 / 28, Sprache 8 / 11, Sensomotorik 26 / 38. Sie sind an den Perzentilen des Gesamtwerts ausgerichtet und wurden nicht gesondert validiert.
- Alle diese Cut-off-Werte wurden an der englischen Version ermittelt. Keiner davon stammt aus einer französischsprachigen Validierung.

Übersetzung Die angebotene Version ist eine Übersetzung der Originalskala von Ritvo et al. (2011). Sie wurde nicht validiert.

Grenzen Der Cut-off-Wert von 65 führt in klinischen Populationen zu vielen falsch-positiven Ergebnissen: 81,5 % der klinischen NovoPsych-Stichprobe überschreiten ihn, die französische Validierung (Picot et al., 2021) berichtet 55,6 % falsch-positive Ergebnisse bei Erwachsenen mit anderen psychischen Störungen, und eine Studie an Erwachsenen, die wegen Verdachts auf ASS überwiesen wurden (Jones et al., 2021), findet eine sehr geringe Spezifität. Dies war der Anlass für die höheren NovoPsych-Cut-off-Werte. Ein hoher Wert zeigt, dass eine vertiefte diagnostische Abklärung sinnvoll ist; er stellt keine Diagnose dar. Umgekehrt kann eine Person, die ihre Merkmale stark kompensiert oder maskiert, einen niedrigen Wert erzielen.

Sind Sie Psycholog:in?

Mit Mentaal erhalten Sie aussagekräftige Informationen, um Ihre Patient:innen zu begleiten.

- Standardisierte Tests
- Automatische Auswertung
- Ergebnisse per E-Mail

Kostenlos testen

Alle Fragebögen ansehen

★★★★★

“Ich nutze Mentaal jetzt seit 2 Monaten, und dieses Tool hat meine Sicht auf die Behandlung und meinen Terminkalender revolutioniert!”

Lena H. - Online-Psychologin (KVT)