


Entrevista para los Trastornos de Ansiedad y Relacionados del DSM-5 (ADIS-5)

La ADIS-5 es una entrevista diagnóstica semiestructurada de referencia que utilizan profesionales de la psicología y otros clínicos para evaluar los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados según los criterios del DSM-5. Permite una exploración en profundidad de los síntomas, el diagnóstico diferencial, las comorbilidades, la evitación, el malestar subjetivo y la repercusión funcional. Muy utilizada en la práctica clínica especializada y en investigación, ayuda a establecer diagnósticos fiables, jerarquizar los problemas clínicos y orientar las decisiones terapéuticas. Su estructura modular permite adaptar la aplicación a los síntomas presentes, lo que la convierte en un instrumento especialmente pertinente para la evaluación exhaustiva de los trastornos de ansiedad en adultos.

Número de preguntas	120 preguntas
Duración estimada	90 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Población destinataria	Adultos
Autores	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Categoría	Ansiedad

Vista previa de las 120 preguntas

Sección del trastorno de pánico:

Preocupación por futuros ataques

0 - Nada | 1 | 2 - Leve | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muy grave

Sección del trastorno de pánico:

Evitación situacional

0 - Nada | 1 | 2 - Leve | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muy grave

Sección del trastorno de pánico:

Sensibilidad o evitación interoceptiva

0 - Nada | 1 | 2 - Leve | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muy grave

Sección del trastorno de pánico:

Señales de seguridad

0 - Nada | 1 | 2 - Leve | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muy grave

Sección del trastorno de pánico:

Distracción

0 - Nada | 1 | 2 - Leve | 3 | 4 - Moderado | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Muy grave

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

El profesional realiza una entrevista semiestructurada, comprueba los criterios diagnósticos del DSM-5 para cada trastorno explorado y asigna una valoración de gravedad clínica (Clinician Severity Rating, CSR) de 0 a 8. Una CSR de 4 o más suele considerarse indicativa de un trastorno clínicamente significativo. La interpretación se basa en la presencia de los criterios, la intensidad de los síntomas, la cronicidad, la evitación, el deterioro funcional y las comorbilidades. El número de preguntas varía según los módulos aplicados.

Uso

Este instrumento no está disponible en Mentaal. Para utilizar este cuestionario en tu práctica, necesitas una licencia de uso válida. Te invitamos a enviarlo directamente desde el sitio web de la editorial.

Ir al sitio web de la editorial ›

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis

Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Uso Mentaal desde hace 2 meses y esta herramienta ha revolucionado mi forma de ver la terapia, ¡y mi agenda!”

 Romane L. - Psicóloga cognitivo-conductual online