ASBPD

Escala de Ardouin de Conducta en la Enfermedad de Parkinson (ASBPD)

La ASBPD es una entrevista clínica estandarizada centrada en los trastornos del estado de ánimo, de la motivación y de la conducta en la enfermedad de Parkinson. Ayuda a identificar y seguir las manifestaciones hipodopaminérgicas e hiperdopaminérgicas, las fluctuaciones no motoras y varias conductas impulsivas o adictivas relacionadas con la enfermedad o con su tratamiento. El instrumento resulta especialmente útil en neuropsicología y en la práctica multidisciplinar para identificar de forma objetiva síntomas que a menudo no se refieren de forma espontánea, afinar la evaluación antes de un ajuste del tratamiento y documentar la evolución a lo largo del seguimiento.

Número de preguntas	21 preguntas
Duración estimada	60 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease
Población destinataria	Adultos con enfermedad de Parkinson
Autores	Claire Ardouin, Isabelle Chéreau, Pierre-Michel Llorca, Estelle Lhommée, Franck Durif, Pierre Pollak, Paul Krack (2009)

Vista previa de las 21 preguntas

Durante el último mes, en comparación con el estado habitual del paciente:

Estado de ánimo depresivo

0 - Sin cambios | 1 - Leve | 2 - Moderado | 3 - Marcado | 4 - Grave

Durante el último mes, en comparación con el estado habitual del paciente:

Estado de ánimo hipomaníaco o maníaco

0 - Sin cambios | 1 - Leve | 2 - Moderado | 3 - Marcado | 4 - Grave

Durante el último mes, en comparación con el estado habitual del paciente:

Ansiedad

0 - Sin cambios | 1 - Leve | 2 - Moderado | 3 - Marcado | 4 - Grave

Durante el último mes, en comparación con el estado habitual del paciente:

Irritabilidad, agresividad

0 - Sin cambios | 1 - Leve | 2 - Moderado | 3 - Marcado | 4 - Grave

Durante el último mes, en comparación con el estado habitual del paciente:

Hiperemotividad

0 - Sin cambios | 1 - Leve | 2 - Moderado | 3 - Marcado | 4 - Grave

Corrección e interpretación

La entrevista explora los síntomas del último mes. Cada ítem se puntúa de 0 a 4 según la intensidad y la frecuencia, desde la ausencia de cambio clínicamente destacable hasta una expresión grave. La interpretación se basa principalmente en el perfil ítem por ítem y en las subpuntuaciones temáticas más que en un punto de corte global único. En la práctica, una puntuación de 2 o más en un ítem es una señal de alerta clínica y sugiere un cambio conductual significativo, que debe valorarse en el contexto neurológico, psiquiátrico y terapéutico.