BNSS

Escala Breve de Síntomas Negativos (BNSS)

La BNSS es una escala heteroaplicada breve, administrada en forma de entrevista semiestructurada, diseñada para evaluar los síntomas negativos de la esquizofrenia y de los trastornos esquizoafectivos. Explora las cinco áreas que hoy se consideran centrales en esta sintomatología, a saber, anhedonia, asociabilidad, abulia, afecto embotado y alogia, con un ítem adicional sobre la ausencia de malestar normal. El instrumento se diseñó para ajustarse mejor a las concepciones actuales de los síntomas negativos que las escalas más antiguas, sin dejar de ser lo bastante breve para la práctica clínica y la investigación. Resulta especialmente útil para medir de forma objetiva la gravedad global, distinguir las dimensiones de motivación-placer y de expresión emocional, seguir la evolución durante el tratamiento y documentar con detalle el perfil sintomático de un paciente.

Número de preguntas	13 preguntas
Duración estimada	12 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Brief Negative Symptom Scale
Población destinataria	Adultos
Autores	Brian Kirkpatrick, Gregory P. Strauss, Linh Nguyen, Bernard A. Fischer, David G. Daniel, Angel Cienfuegos, Stephen R. Marder (2010)
Categoría	Trastornos psicóticos

Vista previa de las 13 preguntas

Intensidad del placer durante las actividades

Subescala: Anhedonia

0 - Ausente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Grave

Frecuencia del placer durante las actividades

Subescala: Anhedonia

0 - Ausente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Grave

Intensidad del placer anticipado en actividades futuras

Subescala: Anhedonia

0 - Ausente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Grave

Malestar

Subescala: Malestar (falta de malestar normal)

0 - Ausente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Grave

Asocialidad: conducta

Subescala: Asocialidad

0 - Ausente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Grave

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 0 a 6 a partir de la entrevista, la conducta observada y la información referida principalmente a los últimos 7 días. La puntuación total es la suma de los 13 ítems y va de 0 a 78. Pueden calcularse subpuntuaciones de anhedonia, asociabilidad, abulia, afecto embotado, alogia y ausencia de malestar. Una puntuación más alta indica una sintomatología negativa más grave. El ítem de malestar se interpreta en términos de reducción del malestar normal. No existe un punto de corte diagnóstico aceptado universalmente, por lo que la interpretación se basa en la gravedad global, el perfil por subdimensiones y el contexto clínico.