

Escala de Ideación Suicida de Beck (BSS)

La Escala de Ideación Suicida de Beck (BSS) es un instrumento clínico que se utiliza para evaluar la gravedad de los pensamientos suicidas en personas en riesgo. Es un instrumento heteroaplicado que detecta la presencia y la intensidad de la ideación suicida, así como las actitudes, conductas e intenciones asociadas al pensamiento suicida, con el fin de apoyar el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas.

Número de preguntas	21 preguntas
Duración estimada	10 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Beck Scale for Suicide Ideation
Población destinataria	Adultos, adolescentes
Autores	Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown (1979)
Categoría	Depresión

Vista previa de las 21 preguntas

Deseo de vivir

- Tengo un deseo de vivir de moderado a fuerte.
- Tengo un deseo débil de vivir.
- No tengo ningún deseo de vivir.

Deseo de morir

- No tengo ningún deseo de morir.
- Tengo un deseo débil de morir.
- Tengo un deseo de morir de moderado a fuerte.

Razones para vivir / razones para morir

- Mis razones para vivir pesan más que mis razones para morir.
- Mis razones para vivir y para morir son más o menos iguales.
- Mis razones para morir pesan más que mis razones para vivir.

Deseo de quitarse la vida

- No tengo ningún deseo de quitarme la vida.
- Tengo un deseo débil de quitarme la vida.
- Tengo un deseo de quitarme la vida de moderado a fuerte.

Actitud ante una situación que pone en peligro la vida

- Si me encontrara en una situación en la que mi vida corriera peligro, intentaría salvarme.
- Si me encontrara en una situación en la que mi vida corriera peligro, dejaría al azar la decisión entre la vida y la muerte.
- Si me encontrara en una situación en la que mi vida corriera peligro, no tomaría las medidas necesarias para evitar la muerte.

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 0 a 2, con una puntuación total de 0 a 38 (los dos primeros ítems sirven como ítems de cribado). Una puntuación alta indica una ideación suicida más marcada. Solo continúan con la escala los pacientes que han respondido afirmativamente a una de las dos primeras preguntas. Las puntuaciones deben interpretarse a la luz del contexto clínico.

Uso

Este instrumento no está disponible en Mentaal. Para utilizar este cuestionario en tu práctica, necesitas una licencia de uso válida. Te invitamos a enviarlo directamente desde el sitio web de la editorial.

Ir al sitio web de la editorial