
Lista de Verificación para la Evaluación del TDAH (CADDRA)



La lista de verificación para la evaluación del TDAH de CADDRA es un instrumento clínico para identificar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y estructurar su evaluación. Utilizada en el marco de las guías canadienses, ayuda al psicólogo o al clínico a revisar los síntomas nucleares del TDAH según los criterios diagnósticos vigentes, así como su repercusión funcional en los distintos ámbitos de la vida. El instrumento se inscribe en un enfoque multimodal que incluye la entrevista clínica, la historia del desarrollo, el cribado de comorbilidades y, si es posible, la información aportada por familiares, docentes u otros profesionales. Resulta especialmente útil para estandarizar el examen de los síntomas de inatención y de hiperactividad-impulsividad, pero no debe interpretarse como un instrumento diagnóstico por sí solo. En la práctica clínica, la lista de CADDRA se utiliza sobre todo para apoyar la evaluación inicial y la documentación estructurada del TDAH en niños, adolescentes y adultos.

Número de preguntas	18 preguntas
Duración estimada	10 minutos
Idioma	Español
Nombre original	ADHD Assessment Checklist
Población destinataria	De la infancia a la edad adulta
Autores	Canadian ADHD Resource Alliance (2006)
Categoría	TDAH

Vista previa de las 18 preguntas

No presta suficiente atención a los detalles, comete errores por descuido

Nada | Un poco | Bastante | Mucho

Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas

Nada | Un poco | Bastante | Mucho

Parece no escuchar cuando se le habla directamente

Nada | Un poco | Bastante | Mucho

No sigue las instrucciones y no termina el trabajo

Nada | Un poco | Bastante | Mucho

Dificultad para organizar tareas y actividades

Nada | Un poco | Bastante | Mucho

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

La lista abarca los 18 síntomas principales del TDAH, puntuados generalmente en una escala de frecuencia o de gravedad. En la práctica, las respuestas que corresponden a una presencia frecuente del síntoma se consideran clínicamente significativas. La interpretación se basa en el número de síntomas de inatención y/o de hiperactividad-impulsividad presentes, con un umbral habitual de 6 síntomas por dominio en niños y adolescentes y de 5 síntomas por dominio a partir de los 17 años. La interpretación debe tener en cuenta además el deterioro funcional, la presencia de dificultades en al menos dos ámbitos, su antigüedad a lo largo del desarrollo y el diagnóstico diferencial. La lista por sí sola no basta para establecer un diagnóstico.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis

Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Uso Mentaal desde hace 2 meses y esta herramienta ha revolucionado mi forma de ver la terapia, ¡y mi agenda!”

 Romane L. - Psicóloga cognitivo-conductual online