CPSS

Escala de Síntomas de Estrés Postraumático Infantil (CPSS)

La CPSS es un instrumento autoaplicado diseñado para medir la gravedad de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en la infancia y la adolescencia tras un acontecimiento traumático. Cuantifica tanto la presencia como la frecuencia de los síntomas, así como el impacto funcional en la vida diaria del niño o la niña.

Número de preguntas	24 preguntas
Duración estimada	10 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Child PTSD Symptom Scale
Población destinataria	Infancia, adolescencia
Autores	Edna B. Foa, David S. F. Raghunath, Marianne S. Davies (2001)
Categoría	TEPT, Infancia

Vista previa de las 24 preguntas

¿Con qué frecuencia te ha molestado este problema en las últimas 2 semanas?

Tener pensamientos o imágenes angustiosas sobre el suceso que te venían a la cabeza sin que quisieras

Nada o solo una vez | Una vez por semana o menos / de vez en cuando | De 2 a 4 veces por semana / la mitad del tiempo | 5 o más veces por semana / casi siempre

¿Con qué frecuencia te ha molestado este problema en las últimas 2 semanas?

Tener sueños desagradables o pesadillas

Nada o solo una vez | Una vez por semana o menos / de vez en cuando | De 2 a 4 veces por semana / la mitad del tiempo | 5 o más veces por semana / casi siempre

¿Con qué frecuencia te ha molestado este problema en las últimas 2 semanas?

Actuar o sentirte como si el suceso estuviera ocurriendo otra vez (oír algo o ver una imagen relacionada y sentir que estás allí de nuevo)

Nada o solo una vez | Una vez por semana o menos / de vez en cuando | De 2 a 4 veces por semana / la mitad del tiempo | 5 o más veces por semana / casi siempre

¿Con qué frecuencia te ha molestado este problema en las últimas 2 semanas?

Sentirte mal cuando piensas en el suceso u oyes hablar de él (por ejemplo, sentir miedo, enfado, tristeza, culpa, etc.)

Nada o solo una vez | Una vez por semana o menos / de vez en cuando | De 2 a 4 veces por semana / la mitad del tiempo | 5 o más veces por semana / casi siempre

¿Con qué frecuencia te ha molestado este problema en las últimas 2 semanas?

Notar reacciones en el cuerpo cuando piensas en el suceso u oyes hablar de él (por ejemplo, ponerte a sudar o que el corazón te lata muy deprisa)

Nada o solo una vez | Una vez por semana o menos / de vez en cuando | De 2 a 4 veces por semana / la mitad del tiempo | 5 o más veces por semana / casi siempre

Corrección e interpretación

La puntuación total se obtiene sumando las respuestas a los 17 primeros ítems, valorados de 0 (nada o solo una vez) a 3 (5 o más veces por semana/casi siempre), con un rango de 0 a 51. Los 7 últimos ítems miden el deterioro funcional, pero normalmente no se incluyen en la puntuación total. Se dispone de puntos de corte para indicar la gravedad del trastorno (leve, moderado, grave).