# Evaluación Diagnóstica para Personas con Discapacidad Grave (DASH-II)




El DASH-II es un cuestionario de evaluación de la psicopatología destinado a personas con discapacidad intelectual grave o profunda. Lo cumplimenta un familiar, un cuidador o un profesional que conozca bien a la persona evaluada. El instrumento explora 13 áreas clínicas, entre ellas la ansiedad, la depresión, la manía, el autismo, la esquizofrenia, las estereotipias, las autolesiones, el sueño, los trastornos de la alimentación y de la eliminación y el control de los impulsos. En la práctica clínica, ayuda a identificar síntomas que a menudo son difíciles de verbalizar, a estructurar la entrevista, a documentar de forma objetiva la frecuencia, la duración y la gravedad de las conductas observadas y, después, a orientar la evaluación diagnóstica y el seguimiento. Es un instrumento de cribado y de ayuda a la decisión clínica, no un diagnóstico en sí mismo.

| | |
|---|---|
| Número de preguntas | 84 preguntas |
| Duración estimada | 15 minutos |
| Idioma | Español |
| Nombre original | Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped |
| Población destinataria | DI grave o profunda |
| Autores | Johnny L. Matson, Wilkins I. Gardner, David A. Coe, Robert Sovner (1995) |

**Administra tus cuestionarios en línea**

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

## Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa en tres dimensiones (frecuencia, duración y gravedad), generalmente en una escala de 0 a 2 según las observaciones recientes del informante. Las puntuaciones se suman por subescala. La interpretación se basa en puntos de corte específicos de cada área. Para varias subescalas principales, la identificación clínica se basa en una puntuación de frecuencia que supera el punto de corte de referencia del manual. Para algunas subescalas conductuales, la presencia de al menos un ítem puntuado como clínicamente significativo en gravedad puede bastar para señalar un

problema que conviene explorar. Los resultados deben contrastarse con la entrevista clínica, la historia del desarrollo, los datos médicos y el contexto del entorno.


## ¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Es un verdadero valor añadido en consulta para evaluar al paciente y una base de diálogo muy rica para profundizar en el trabajo clínico.”

Elodie C. - Psicóloga cognitivo-conductual