
Inventario Multidimensional de Disociación (MDI)



El Inventario Multidimensional de Disociación (MDI) es un cuestionario autoaplicado estandarizado diseñado para medir varias dimensiones de los síntomas disociativos, en particular en contextos de trauma psicológico, estrés postraumático complejo y psicopatología disociativa. Utilizado en la práctica clínica y en investigación, ayuda al profesional de la psicología a identificar la intensidad y el perfil de las manifestaciones disociativas actuales, como la desconexión, la despersonalización, la desrealización, la constricción emocional, las alteraciones de la memoria y la disociación de la identidad. El MDI es un instrumento útil para el cribado, la evaluación inicial, la orientación diagnóstica y el seguimiento de la evolución de los síntomas, pero no sustituye a una entrevista clínica en profundidad ni a una evaluación diagnóstica especializada de los trastornos disociativos.

Número de preguntas	30 preguntas
Duración estimada	10 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Multiscale Dissociation Inventory
Población destinataria	Adolescentes, adultos
Autores	John Briere (2002)

Vista previa de las 30 preguntas

Despistes u olvidos.

Nunca | Una o dos veces | A veces | A menudo | Muy a menudo

Sentir su cuerpo como si fuera de otra persona.

Nunca | Una o dos veces | A veces | A menudo | Muy a menudo

Que, de repente, las cosas a su alrededor no le parezcan del todo normales, un poco raras.

Nunca | Una o dos veces | A veces | A menudo | Muy a menudo

Saber que debe de estar alterado/a, pero no ser capaz de sentirlo.

Nunca | Una o dos veces | A veces | A menudo | Muy a menudo

Que otras personas le digan que usted dijo o hizo algo que no recuerda haber dicho o hecho.

Nunca | Una o dos veces | A veces | A menudo | Muy a menudo

Corrección e interpretación

Los 30 ítems se puntúan en una escala de frecuencia de 5 puntos. Las respuestas se suman por subescala para obtener un perfil disociativo multidimensional; la interpretación se basa principalmente en las seis subescalas y puede incluir conversiones normativas a puntuaciones típicas según el manual. Las puntuaciones más altas indican una sintomatología disociativa más marcada. La interpretación debe tener en cuenta el contexto traumático, el cuadro clínico global y los diagnósticos diferenciales; el MDI por sí solo no permite establecer un diagnóstico.

Uso

Este instrumento no está disponible en Mentaal. Para utilizar este cuestionario en tu práctica, necesitas una licencia de uso válida. Te invitamos a enviarlo directamente desde el sitio web de la editorial.