SOPS

Escala de Síntomas Prodrómicos (SOPS)

La Escala de Síntomas Prodrómicos (SOPS) es un instrumento clínico que se utiliza para evaluar la gravedad de los síntomas prodrómicos asociados a un mayor riesgo de desarrollar un trastorno psicótico, en particular la esquizofrenia. Se utiliza principalmente en consultas especializadas con pacientes de alto riesgo.

Número de preguntas	19 preguntas
Duración estimada	30 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Scale of Prodromal Symptoms
Población destinataria	Adolescentes, adultos jóvenes
Autores	Barbara A. Cornblatt, Thomas H. McGlashan, Scott W. Woods, Jean Addington (2001)

Vista previa de las 19 preguntas

P1. Contenido inusual del pensamiento/Ideas delirantes

0 - Ausente | 1 - Presencia dudosa | 2 - Ligero | 3 - Moderado | 4 - Moderadamente grave | 5 - Grave pero no psicótico | 6 - Grave y psicótico

P2. Suspicacia/Ideas persecutorias

0 - Ausente | 1 - Presencia dudosa | 2 - Ligero | 3 - Moderado | 4 - Moderadamente grave | 5 - Grave pero no psicótico | 6 - Grave y psicótico

P3. Grandiosidad

0 - Ausente | 1 - Presencia dudosa | 2 - Ligero | 3 - Moderado | 4 - Moderadamente grave | 5 - Grave pero no psicótico | 6 - Grave y psicótico

P4. Percepciones anómalas/Alucinaciones

0 - Ausente | 1 - Presencia dudosa | 2 - Ligero | 3 - Moderado | 4 - Moderadamente grave | 5 - Grave pero no psicótico | 6 - Grave y psicótico

P5. Comunicación desorganizada

0 - Ausente | 1 - Presencia dudosa | 2 - Ligero | 3 - Moderado | 4 - Moderadamente grave | 5 - Grave pero no psicótico | 6 - Grave y psicótico

Corrección e interpretación

La SOPS consta de 19 ítems repartidos en cuatro dominios: síntomas positivos, negativos, de desorganización y generales. Cada ítem se puntúa de 0 (ausente) a 6 (grave y psicótico). La puntuación total y las puntuaciones de las subescalas permiten describir el perfil sintomático del paciente y detectar un posible riesgo de transición a la psicosis.