


Entretien diagnostique des troubles anxieux et apparentés pour le DSM-5 (ADIS-5)

L'ADIS-5 est un entretien diagnostique semi-structuré de référence utilisé par les psychologues et autres cliniciens pour évaluer les troubles anxieux et les troubles apparentés selon les critères du DSM-5. Il permet une exploration approfondie des symptômes, du diagnostic différentiel, des comorbidités, de l'évitement, de la détresse subjective et du retentissement fonctionnel. Très utilisé en pratique clinique spécialisée et en recherche, cet outil aide à poser des diagnostics fiables, à hiérarchiser les problématiques cliniques et à orienter l'indication thérapeutique. Sa structure modulaire permet d'adapter la passation aux symptômes présents, ce qui en fait un instrument particulièrement pertinent pour l'évaluation complète des troubles anxieux chez l'adulte.

Nombre de questions	120 questions
Durée estimée	90 minutes
Langue	Français
Nom original	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Public cible	Adulte
Auteurs	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Catégorie	Anxiété

Aperçu des 120 questions

Section Trouble panique :

Inquiétude à l'idée d'avoir d'autres attaques

0 - Aucun | 1 | 2 - Léger | 3 | 4 - Modéré | 5 | 6 - Sévère | 7 | 8 - Très sévère

Section Trouble panique :

Évitement situationnel

0 - Aucun | 1 | 2 - Léger | 3 | 4 - Modéré | 5 | 6 - Sévère | 7 | 8 - Très sévère

Section Trouble panique :

Sensibilité ou évitement intéroceptif

0 - Aucun | 1 | 2 - Léger | 3 | 4 - Modéré | 5 | 6 - Sévère | 7 | 8 - Très sévère

Section Trouble panique :

Signaux de sécurité

0 - Aucun | 1 | 2 - Léger | 3 | 4 - Modéré | 5 | 6 - Sévère | 7 | 8 - Très sévère

Section Trouble panique :

Distraction

0 - Aucun | 1 | 2 - Léger | 3 | 4 - Modéré | 5 | 6 - Sévère | 7 | 8 - Très sévère

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Le clinicien conduit un entretien semi-structuré, vérifie les critères diagnostiques DSM-5 pour chaque trouble exploré et attribue une note de sévérité clinique (Clinician Severity Rating, CSR) de 0 à 8. Une CSR de 4 ou plus est généralement considérée comme indiquant un trouble cliniquement significatif. L'interprétation repose sur la présence des critères, l'intensité des symptômes, la chronicité, l'évitement, l'altération fonctionnelle et les comorbidités. Le nombre de questions varie selon les modules administrés.

Utilisation

Cet outil n'est pas disponible sur Mentaal. Pour pouvoir utiliser ce questionnaire dans votre pratique, vous devez disposer d'une licence d'utilisation valide. Nous vous invitons à l'envoyer directement depuis le site de l'éditeur.

Accéder au site de l'éditeur ›

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Sceptique au départ, je ne peux finalement plus me passer de cet outil dans ma pratique.”

 Elodie C. - Psychologue TCC