ASBPD

Échelle d’évaluation comportementale de la maladie de Parkinson (ASBPD)

L’ASBPD est un entretien clinique standardisé consacré aux troubles thymiques, motivationnels et comportementaux dans la maladie de Parkinson. Il aide à repérer et à suivre les manifestations hypo dopaminergiques et hyper dopaminergiques, les fluctuations non motrices et plusieurs conduites impulsives ou addictives liées à la maladie ou à son traitement. L’outil est particulièrement utile en neuropsychologie et en pratique pluridisciplinaire pour objectiver des symptômes souvent peu spontanément rapportés, affiner l’évaluation avant ajustement thérapeutique et documenter l’évolution au fil du suivi.

Nombre de questions	21 questions
Durée estimée	60 minutes
Langue	Français
Nom original	Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease
Public cible	Adulte parkinsonien
Auteurs	Claire Ardouin, Isabelle Chéreau, Pierre-Michel Llorca, Estelle Lhommée, Franck Durif, Pierre Pollak, Paul Krack (2009)

Aperçu des 21 questions

Au cours du dernier mois, par rapport à l'état habituel du patient :

Humeur dépressive

0 - Aucune modification | 1 - Légère | 2 - Modérée | 3 - Marquée | 4 - Sévère

Au cours du dernier mois, par rapport à l'état habituel du patient :

Humeur hypomaniaque ou maniaque

0 - Aucune modification | 1 - Légère | 2 - Modérée | 3 - Marquée | 4 - Sévère

Au cours du dernier mois, par rapport à l'état habituel du patient :

Anxiété

0 - Aucune modification | 1 - Légère | 2 - Modérée | 3 - Marquée | 4 - Sévère

Au cours du dernier mois, par rapport à l'état habituel du patient :

Irritabilité, agressivité

0 - Aucune modification | 1 - Légère | 2 - Modérée | 3 - Marquée | 4 - Sévère

Au cours du dernier mois, par rapport à l'état habituel du patient :

Hyperémotivité

0 - Aucune modification | 1 - Légère | 2 - Modérée | 3 - Marquée | 4 - Sévère

Cotations & interprétations

L'entretien explore les symptômes du dernier mois. Chaque item est coté de 0 à 4 selon l'intensité et la fréquence, de l'absence de modification cliniquement notable à une expression sévère. L'interprétation repose surtout sur le profil item par item et sur les sous scores thématiques plutôt que sur un seuil global unique. Un score d'item égal ou supérieur à 2 constitue en pratique un signal d'alerte clinique et suggère une modification comportementale significative à discuter dans le contexte neurologique, psychiatrique et thérapeutique.