BNSS

Échelle brève des symptômes négatifs (BNSS)

La BNSS est une échelle clinicienne brève, administrée sous forme d'entretien semi-structuré, destinée à l'évaluation des symptômes négatifs de la schizophrénie et des troubles schizo-affectifs. Elle explore les cinq domaines aujourd'hui considérés comme centraux dans cette symptomatologie, à savoir l'anhédonie, l'asocialité, l'avolition, l'émoussement affectif et l'alogie, avec un item supplémentaire portant sur l'absence de détresse habituelle. L'outil a été conçu pour être plus sensible aux conceptions contemporaines des symptômes négatifs que les anciennes échelles, tout en restant assez court pour la pratique clinique et la recherche. Il est particulièrement utile pour objectiver la sévérité globale, distinguer les dimensions motivation-plaisir et expression émotionnelle, suivre l'évolution sous traitement et documenter finement le profil symptomatique d'un patient.

Nombre de questions	13 questions
Durée estimée	12 minutes
Langue	Français
Nom original	Brief Negative Symptom Scale
Public cible	Adulte
Auteurs	Brian Kirkpatrick, Gregory P. Strauss, Linh Nguyen, Bernard A. Fischer, David G. Daniel, Angel Cienfuegos, Stephen R. Marder (2010)
Catégorie	Troubles psychotiques

Aperçu des 13 questions

Intensité du plaisir pendant les activités

Sous-échelle : Anhédonie

0 - Absent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Sévère

Fréquence du plaisir pendant les activités

Sous-échelle : Anhédonie

0 - Absent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Sévère

Intensité du plaisir anticipé lors des activités futures

Sous-échelle : Anhédonie

0 - Absent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Sévère

Détresse

Sous-échelle : Détresse (absence de détresse normale)

0 - Absent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Sévère

Asocialité : comportement

Sous-échelle : Asocialité

0 - Absent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Sévère

Cotations & interprétations

Chaque item est coté de 0 à 6 à partir de l'entretien, du comportement observé et des informations portant principalement sur les 7 derniers jours. Le score total correspond à la somme des 13 items, avec un intervalle de 0 à 78. Des sous scores peuvent être calculés pour l'anhédonie, l'asocialité, l'avolition, l'émoussement affectif, l'alogie et l'absence de détresse. Un score plus élevé indique une symptomatologie négative plus sévère. L'item de détresse est interprété dans le sens d'une diminution de la détresse normale. Il n'existe pas de seuil diagnostique universellement retenu, l'interprétation repose donc sur l'intensité globale, le profil des sous dimensions et le contexte clinique.