BPDSI

Index de sévérité du trouble de la personnalité borderline (BPDSI)

Le BPDSI est un entretien semi-structuré conçu pour évaluer la gravité des symptômes du trouble de la personnalité borderline au cours des trois derniers mois. Il permet d'obtenir une mesure quantitative des manifestations cliniques principales du trouble selon les critères du DSM, facilitant le suivi de l'évolution de la symptomatologie et l'évaluation de l'efficacité thérapeutique.

Nombre de questions	70 questions
Durée estimée	40 minutes
Langue	Français
Nom original	Borderline Personality Disorder Severity Index
Public cible	Adultes avec suspicion de trouble borderline
Auteurs	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Catégorie	Troubles de la personnalité

Aperçu des 70 questions

Au cours des trois derniers mois, vous est-il arrivé d'être désespéré(e) parce que vous pensiez qu'une personne à qui vous tenez allait vous abandonner ?

Pour coter positivement, des exemples clairs sont nécessaires.

0 - Jamais | 1 - 1 fois en 3 mois | 2 - 2 fois en 3 mois | 3 - 3 fois en 3 mois / 1 fois par mois | 4 - 4 à 5 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 3 semaines | 5 - 6 à 7 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 2 semaines | 6 - 8 à 10 fois en 3 mois / 2 fois en 3 semaines | 7 - 1 fois par semaine / 11 à 15 fois en 3 mois | 8 - Plusieurs fois par semaine mais moins de la moitié de la semaine | 9 - Plus de la moitié de la semaine / presque tous les jours | 10 - Tous les jours

Au cours des trois derniers mois, avez-vous essayé de retenir de façon acharnée une personne importante pour vous qui voulait vous éviter (ou dont vous pensiez qu'elle voulait vous éviter) ?

Par exemple appels incessants, vérifications, séduction... Seuls les comportements exagérés, forcés, frénétiques sont cotés. L'item porte sur un abandon réel ou imaginé ; pour coter positivement, des exemples clairs de tentatives sont nécessaires.

0 - Jamais | 1 - 1 fois en 3 mois | 2 - 2 fois en 3 mois | 3 - 3 fois en 3 mois / 1 fois par mois | 4 - 4 à 5 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 3 semaines | 5 - 6 à 7 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 2 semaines | 6 - 8 à 10 fois en 3 mois / 2 fois en 3 semaines | 7 - 1 fois par semaine / 11 à 15 fois en 3 mois | 8 - Plusieurs fois par semaine mais moins de la moitié de la semaine | 9 - Plus de la moitié de la semaine / presque tous les jours | 10 - Tous les jours

Au cours des trois derniers mois, vous est-il arrivé de supplier quelqu'un ou de pleurer pour qu'il ne vous quitte pas ?

0 - Jamais | 1 - 1 fois en 3 mois | 2 - 2 fois en 3 mois | 3 - 3 fois en 3 mois / 1 fois par mois | 4 - 4 à 5 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 3 semaines | 5 - 6 à 7 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 2 semaines | 6 - 8 à 10 fois en 3 mois / 2 fois en 3 semaines | 7 - 1 fois par semaine / 11 à 15 fois en 3 mois | 8 - Plusieurs fois par semaine mais moins de la moitié de la semaine | 9 - Plus de la moitié de la semaine / presque tous les jours | 10 - Tous les jours

Au cours des trois derniers mois, vous est-il arrivé de menacer de faire quelque chose pour être sûr(e) que quelqu'un ne vous quitte pas ?

Par exemple chantage, mensonges, meurtre, suicide.

0 - Jamais | 1 - 1 fois en 3 mois | 2 - 2 fois en 3 mois | 3 - 3 fois en 3 mois / 1 fois par mois | 4 - 4 à 5 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 3 semaines | 5 - 6 à 7 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 2 semaines | 6 - 8 à 10 fois en 3 mois / 2 fois en 3 semaines | 7 - 1 fois par semaine / 11 à 15 fois en 3 mois | 8 - Plusieurs fois par semaine mais moins de la moitié de la semaine | 9 - Plus de la moitié de la semaine / presque tous les jours | 10 - Tous les jours

Au cours des trois derniers mois, vous est-il arrivé d'essayer d'empêcher physiquement quelqu'un de vous quitter ?

Par exemple en vous plaçant devant une porte, en retenant la personne.

0 - Jamais | 1 - 1 fois en 3 mois | 2 - 2 fois en 3 mois | 3 - 3 fois en 3 mois / 1 fois par mois | 4 - 4 à 5 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 3 semaines | 5 - 6 à 7 fois en 3 mois / 1 fois toutes les 2 semaines | 6 - 8 à 10 fois en 3 mois / 2 fois en 3 semaines | 7 - 1 fois par semaine / 11 à 15 fois en 3 mois | 8 - Plusieurs fois par semaine mais moins de la moitié de la semaine | 9 - Plus de la moitié de la semaine / presque tous les jours | 10 - Tous les jours

Cotations & interprétations

Chaque item est coté sur une échelle de fréquence de 0 (jamais) à 10 (quotidien ou constamment présent). Les scores de chaque critère DSM sont additionnés pour obtenir un score total, indiquant la gravité globale du trouble. Il existe également des scores par dimension.