
Liste d’évaluation du TDAH de la CADDRA (CADDRA)



La ADHD Assessment Checklist de la CADDRA est un outil clinique de repérage et de structuration de l’évaluation du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Utilisée dans le cadre des recommandations canadiennes, elle aide le psychologue ou le clinicien à passer en revue les symptômes centraux du TDAH selon les critères diagnostiques actuels, ainsi que leur retentissement fonctionnel dans différents contextes de vie. L’outil s’intègre à une démarche multimodale incluant l’entretien clinique, l’anamnèse développementale, la recherche de comorbidités et, si possible, des informations provenant de proches, d’enseignants ou d’autres professionnels. Il est particulièrement utile pour standardiser l’examen des symptômes d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité, mais ne doit pas être interprété comme un instrument diagnostique autonome. En pratique clinique, la checklist CADDRA est surtout employée comme support d’évaluation initiale et de documentation structurée du TDAH chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.

Nombre de questions	18 questions
Durée estimée	10 minutes
Langue	Français
Nom original	ADHD Assessment Checklist
Public cible	Enfant à adulte
Auteurs	Canadian ADHD Resource Alliance (2006)
Catégorie	TDAH

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

La checklist reprend les 18 symptômes principaux du TDAH, généralement cotés sur une échelle de fréquence ou de gravité. En pratique, les réponses correspondant à une présence fréquente du symptôme sont retenues comme cliniquement significatives. L'interprétation repose sur le nombre de symptômes d'inattention et/ou d'hyperactivité-impulsivité présents, avec un seuil usuel de 6 symptômes par domaine chez l'enfant et l'adolescent, et de 5 symptômes par domaine à partir de 17 ans. L'interprétation doit aussi tenir compte du retentissement fonctionnel, de la présence des difficultés dans au moins deux milieux, de leur ancienneté développementale et du diagnostic différentiel. La checklist ne suffit pas à elle seule pour poser un diagnostic.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement

Voir tous les questionnaires

★★★★★

"La cotation automatique me fait gagner un temps fou et mes patients sont nettement plus enclins à remplir les questionnaires."

Samia T. - Psychologue en ligne