

Entretien diagnostique du trouble du spectre de l'autisme (DASI-2)

Le DASI-2 est un entretien clinique semi-structuré destiné à soutenir l'évaluation diagnostique du trouble du spectre de l'autisme chez les personnes de plus de 2 ans. Il est conçu pour les psychologues et autres cliniciens et s'aligne directement sur les critères du DSM-5 et de la CIM-11. L'outil explore de façon systématique l'histoire développementale, la communication sociale, les comportements restreints et répétitifs, le retentissement fonctionnel, la présence des symptômes dans plusieurs contextes, ainsi que les stratégies de compensation comme le masquage. Il intègre aussi des invites concernant les comorbidités possibles et peut être complété par un relevé observationnel structuré portant sur la communication, la compréhension émotionnelle, la compréhension sociale, l'imagination et la présentation générale.

Nombre de questions	7 questions
Durée estimée	120 minutes
Langue	Français
Nom original	Diagnostic Autism Spectrum Interview
Public cible	Enfant à adulte
Auteurs	Susan J. Young (2025)
Catégorie	TSA

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

La cotation est réalisée par le clinicien. Chaque catégorie symptomatique est jugée à partir des réponses et des exemples fournis au cours de l'entretien. Une catégorie est retenue si au moins un élément correspondant est coté comme présent, ou partiellement présent avec retentissement et ou compensation importante. Pour conclure à un TSA selon l'algorithme

fondé sur le DSM-5-TR, les 3 catégories de communication sociale et d'interaction sociale doivent être validées, ainsi qu'au moins 2 des 4 catégories de comportements restreints et répétitifs. Il faut aussi confirmer la présence des manifestations dans plusieurs contextes, leur ancienneté développementale, leur retentissement cliniquement significatif, et vérifier qu'elles ne sont pas mieux expliquées par un retard global du développement. Le clinicien formule ensuite le niveau de soutien requis. Le relevé observationnel, lorsqu'il est utilisé, complète l'interprétation de manière qualitative.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement

Voir tous les questionnaires

★★★★★

"Mentaal a véritablement simplifié ma pratique en ligne grâce à la cotation automatique et l'envoi fluide des questionnaires."

Basile R. - Psychologue clinicien