

Échelle TDAH chez l'enfant (SNAP-IV)

Le SNAP-IV est une échelle d'évaluation comportementale utilisée principalement pour dépister les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et les troubles oppositionnels chez l'enfant. Elle permet de recueillir des informations auprès des enseignants et des parents sur la fréquence et la sévérité des symptômes liés au TDAH et à d'autres troubles du comportement.

Nombre de questions	26 questions
Durée estimée	6 minutes
Langue	Français
Nom original	Swanson, Nolan, and Pelham-IV Scale
Public cible	Enfants (6-18 ans)
Auteurs	James M. Swanson, Richard Nolan, Daniel Pelham (2001)
Catégorie	TDAH, Enfance

Aperçu des 26 questions

Ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans ses travaux scolaires

Jamais ou pas du tout | Un peu | Souvent | Très souvent

A de la difficulté à soutenir son attention dans les tâches ou dans les jeux

Jamais ou pas du tout | Un peu | Souvent | Très souvent

Semble ne pas écouter lorsqu'on lui parle personnellement

Jamais ou pas du tout | Un peu | Souvent | Très souvent

Ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à terminer ses travaux scolaires

Jamais ou pas du tout | Un peu | Souvent | Très souvent

A de la difficulté à organiser ses tâches ou ses activités

Jamais ou pas du tout | Un peu | Souvent | Très souvent

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque item est coté sur une échelle de 0 (Jamais ou pas du tout) à 3 (Très souvent). Les items sont regroupés en trois sous-échelles : Inattention (items 1 à 9), Hyperactivité/Impulsivité (items 10 à 18) et Trouble Oppositionnel (items 19 à 26). Le score de chaque sous-échelle correspond à la somme des items qui la composent, et est comparé à des seuils cliniques (léger, modéré, sévère) pour orienter le dépistage.

Exemple de cotation

Cotation

SCORE TOTAL TDAH

26 / 54

• Symptômes légers

0 — 17	Symptômes non cliniquement significatifs
18 — 27	**Symptômes légers** ◀ 26
28 — 39	Symptômes modérés
40 — 54	Symptômes sévères

Le score total est le score TDAH combiné : Inattention + Hyperactivité / impulsivité, soit 18 items cotés sur 54. Les items d'opposition sont cotés séparément. Le décompte des symptômes n'atteint le seuil ni d'un TDAH ni d'un trouble oppositionnel avec provocation.

SOUS-ÉCHELLES

Inattention 12 / 27

Items 1 à 9 : distractibilité, oublis, difficulté à soutenir l'attention et à s'organiser

• Symptômes non cliniquement significatifs

• Décompte : 4 / 9 symptômes présents (seuil ≥ 6)

• Sévérité moyenne : 1,3 / 3 (atteinte clinique probable à partir de 1,5)

0 — 12	**Symptômes non cliniquement significatifs**	**◀ 12**
13 — 17	Symptômes légers	
18 — 22	Symptômes modérés	
23 — 27	Symptômes sévères	

Hyperactivité / impulsivité — 14 / 27

Items 10 à 18 : agitation motrice, difficulté à rester en place, impatience, interruptions

• Symptômes légers
• Décompte : 5 / 9 symptômes présents (seuil ≥ 6)
• Sévérité moyenne : 1,6 / 3 (atteinte clinique probable à partir de 1,5)

0 — 12	Symptômes non cliniquement significatifs	
13 — 17	**Symptômes légers**	**◀ 14**
18 — 22	Symptômes modérés	
23 — 27	Symptômes sévères	

Opposition / provocation — 8 / 24


Items 19 à 26 : colères, contestation des adultes, refus des règles, susceptibilité

• Symptômes légers
• Décompte : 2 / 8 symptômes présents (seuil ≥ 4)
• Sévérité moyenne : 1,0 / 3 (atteinte clinique probable à partir de 1,5)


0 — 7	Symptômes non cliniquement significatifs	
8 — 13	**Symptômes légers**	**◀ 8**
14 — 18	Symptômes modérés	
19 — 24	Symptômes sévères	

Barème de la CADDRA (guide de notation SNAP-IV 26, ADHD TrEAT). Un symptôme est compté comme présent lorsqu'il est coté « Souvent » ou « Très souvent ». La sévérité moyenne divise le score du domaine par son nombre d'items. Le ⚠ signale un domaine dont le décompte atteint le seuil.

SCORE TOTAL TDAH




SCORE PAR DOMAINE



Non significatif Léger Modéré Sévère

Entre parenthèses, la sévérité moyenne par item, dont l'atteinte clinique est probable à partir de 1,5.

DÉCOMPTE DES SYMPTÔMES



Sous le seuil Seuil atteint

Un symptôme est compté présent lorsqu'il est coté « Souvent » ou « Très souvent ».

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Mentaal est devenu un allié indispensable pour structurer mes évaluations et approfondir la compréhension clinique de mes patients.”

 Nolwenn P. - Psychologue TCC