


Intervista diagnostica per i disturbi d'ansia e correlati secondo il DSM-5 (ADIS-5)

L'ADIS-5 è un'intervista diagnostica semistrutturata di riferimento, utilizzata da psicologi e altri clinici per valutare i disturbi d'ansia e i disturbi correlati secondo i criteri del DSM-5. Permette un'esplorazione approfondita dei sintomi, della diagnosi differenziale, delle comorbilità, dell'evitamento, del disagio soggettivo e dell'impatto funzionale. Ampiamente utilizzato nella pratica clinica specialistica e nella ricerca, questo strumento aiuta a formulare diagnosi affidabili, a stabilire le priorità tra i problemi clinici e a orientare le decisioni terapeutiche. La sua struttura modulare permette di adattare la somministrazione ai sintomi presenti, il che lo rende uno strumento particolarmente utile per la valutazione completa dei disturbi d'ansia negli adulti.

Numero di domande	120 domande
Durata stimata	90 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Destinatari	Adulti
Autori	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Categoria	Ansia

Anteprima delle 120 domande

Sezione sul disturbo di panico:

Preoccupazione per futuri attacchi

0 - Nessuna | 1 | 2 - Lieve | 3 | 4 - Moderata | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Molto grave

Sezione sul disturbo di panico:

Evitamento situazionale

0 - Nessuna | 1 | 2 - Lieve | 3 | 4 - Moderata | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Molto grave

Sezione sul disturbo di panico:

Sensibilità/evitamento enterocettivo

0 - Nessuna | 1 | 2 - Lieve | 3 | 4 - Moderata | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Molto grave

Sezione sul disturbo di panico:

Segnali di sicurezza

0 - Nessuna | 1 | 2 - Lieve | 3 | 4 - Moderata | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Molto grave

Sezione sul disturbo di panico:

Distrazione

0 - Nessuna | 1 | 2 - Lieve | 3 | 4 - Moderata | 5 | 6 - Grave | 7 | 8 - Molto grave

Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

Scoring e interpretazione

Il clinico conduce un'intervista semistrutturata, verifica i criteri diagnostici del DSM-5 per ciascun disturbo esplorato e assegna un punteggio di gravità clinica (Clinician Severity Rating, CSR) da 0 a 8. Un CSR pari o superiore a 4 è generalmente considerato indicativo di un disturbo clinicamente significativo. L'interpretazione si basa sulla presenza dei criteri, sull'intensità dei sintomi, sulla cronicità, sull'evitamento, sulla compromissione funzionale e sulle comorbilità. Il numero di domande varia in base ai moduli somministrati.

Utilizzo

Questo strumento non è disponibile su Mentaal. Per usare questo questionario nella tua pratica devi disporre di una licenza d'uso valida. Ti invitiamo a inviarlo direttamente dal sito dell'editore.

Vai al sito dell'editore ›

Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis

Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Scettica all'inizio, ora non posso più fare a meno di questo strumento nella mia pratica.”

 Elodie C. - Psicologa cognitivo-comportamentale