

Test di identificazione dei disturbi da uso di alcol (AUDIT)

L'AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) è uno strumento di screening sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per individuare i comportamenti a rischio legati al consumo di alcol. È stato concepito per rilevare precocemente i disturbi da uso di alcol e valutare la gravità del consumo.

Numero di domande	10 domande
Durata stimata	2 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Alcohol Use Disorders Identification Test
Autori	Babor, Higgins-Biddle, Saunders e Monteiro (OMS, 2001); versione italiana: Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale Alcol (Scafato et al., 2016)
Categoria	Dipendenze

Anteprima delle 10 domande

Con quale frequenza consuma bevande contenenti alcol?

Mai | Meno di 1 volta / 1 volta al mese | 2-4 volte al mese | 2-3 volte a settimana | 4 o più volte a settimana

Nei giorni in cui beve, quante bevande alcoliche consuma in media in una giornata tipica?

1 o 2 | 3 o 4 | 5 o 6 | 7 o 9 | 10 o più

Con quale frequenza le capita di consumare 6 o più bevande alcoliche in un'unica occasione?

Mai | Meno di una volta al mese | 1 volta al mese | 1 volta alla settimana | Ogni giorno o quasi

Con quale frequenza durante l'ultimo anno si è accorto/a di non riuscire a smettere di bere una volta che aveva iniziato?

Mai | Meno di una volta al mese | 1 volta al mese | 1 volta alla settimana | Ogni giorno o quasi

Con quale frequenza durante l'ultimo anno non è riuscito/a a fare ciò che normalmente ci si aspetta da lei a causa del bere?

Mai | Meno di una volta al mese | 1 volta al mese | 1 volta alla settimana | Ogni giorno o quasi

Il questionario completo (10 domande) si somministra online su Mentaal.

Somministra questo questionario online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org

Scoring e interpretazione

Scoring automatico con Mentaal

I risultati con i punteggi ti verranno inviati automaticamente non appena il tuo paziente avrà completato il questionario. Ecco un esempio:

Scoring

Punteggio: 15/40

0 — 7	Consumo a basso rischio
8 — 15	**Consumo a rischio** ◀ 15
16 — 19	Consumo dannoso
20 — 40	Possibile alcoldipendenza

