BPDSI

Indice di gravità del disturbo borderline di personalità (BPDSI)

Il BPDSI è un'intervista semistrutturata pensata per valutare la gravità dei sintomi del disturbo borderline di personalità negli ultimi tre mesi. Fornisce una misura quantitativa delle principali manifestazioni cliniche del disturbo secondo i criteri del DSM, facilitando il monitoraggio dell'evoluzione dei sintomi e la valutazione dell'efficacia del trattamento.

Numero di domande	70 domande
Durata stimata	40 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Borderline Personality Disorder Severity Index
Destinatari	Adulti con sospetto disturbo borderline di personalità
Autori	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Categoria	Disturbi di personalità

Anteprima delle 70 domande

Negli ultimi tre mesi, le è mai capitato di sentirsi disperato/a al pensiero che una persona a cui tiene stesse per abbandonarla?

Per un punteggio positivo sono necessari esempi chiari.

0 - Mai | 1 - 1 volta in 3 mesi | 2 - 2 volte in 3 mesi | 3 - 3 volte in 3 mesi / 1 volta al mese | 4 - da 4 a 5 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 3 settimane | 5 - da 6 a 7 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 2 settimane | 6 - da 8 a 10 volte in 3 mesi / 2 volte in 3 settimane | 7 - 1 volta a settimana / da 11 a 15 volte in 3 mesi | 8 - Più volte a settimana ma meno della metà della settimana | 9 - Più di metà della settimana / quasi ogni giorno | 10 - Ogni giorno

Negli ultimi tre mesi, ha mai cercato in modo fanatico di trattenere con sé una persona importante per lei che voleva evitarla (o che pensava volesse evitarla)?

Ad esempio telefonate continue, controlli, seduzione... Vengono valutate solo le modalità esagerate, forzate, frenetiche. Questo item riguarda l'abbandono reale e immaginato; per un punteggio positivo sono necessari esempi chiari di tentativi.

0 - Mai | 1 - 1 volta in 3 mesi | 2 - 2 volte in 3 mesi | 3 - 3 volte in 3 mesi / 1 volta al mese | 4 - da 4 a 5 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 3 settimane | 5 - da 6 a 7 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 2 settimane | 6 - da 8 a 10 volte in 3 mesi / 2 volte in 3 settimane | 7 - 1 volta a settimana / da 11 a 15 volte in 3 mesi | 8 - Più volte a settimana ma meno della metà della settimana | 9 - Più di metà della settimana / quasi ogni giorno | 10 - Ogni giorno

Negli ultimi tre mesi, le è mai capitato di supplicare o di piangere perché qualcuno non la lasciasse?

0 - Mai | 1 - 1 volta in 3 mesi | 2 - 2 volte in 3 mesi | 3 - 3 volte in 3 mesi / 1 volta al mese | 4 - da 4 a 5 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 3 settimane | 5 - da 6 a 7 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 2 settimane | 6 - da 8 a 10 volte in 3 mesi / 2 volte in 3 settimane | 7 - 1 volta a settimana / da 11 a 15 volte in 3 mesi | 8 - Più volte a settimana ma meno della metà della settimana | 9 - Più di metà della settimana / quasi ogni giorno | 10 - Ogni giorno

Negli ultimi tre mesi, ha mai minacciato di fare qualcosa per essere sicuro/a che qualcuno non la lasciasse?

Ad esempio ricatti, bugie, omicidio, suicidio.

0 - Mai | 1 - 1 volta in 3 mesi | 2 - 2 volte in 3 mesi | 3 - 3 volte in 3 mesi / 1 volta al mese | 4 - da 4 a 5 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 3 settimane | 5 - da 6 a 7 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 2 settimane | 6 - da 8 a 10 volte in 3 mesi / 2 volte in 3 settimane | 7 - 1 volta a settimana / da 11 a 15 volte in 3 mesi | 8 - Più volte a settimana ma meno della metà della settimana | 9 - Più di metà della settimana / quasi ogni giorno | 10 - Ogni giorno

Negli ultimi tre mesi, ha mai cercato di impedire fisicamente a qualcuno di lasciarla?

Ad esempio mettendosi davanti a una porta, trattenendo la persona.

0 - Mai | 1 - 1 volta in 3 mesi | 2 - 2 volte in 3 mesi | 3 - 3 volte in 3 mesi / 1 volta al mese | 4 - da 4 a 5 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 3 settimane | 5 - da 6 a 7 volte in 3 mesi / 1 volta ogni 2 settimane | 6 - da 8 a 10 volte in 3 mesi / 2 volte in 3 settimane | 7 - 1 volta a settimana / da 11 a 15 volte in 3 mesi | 8 - Più volte a settimana ma meno della metà della settimana | 9 - Più di metà della settimana / quasi ogni giorno | 10 - Ogni giorno

Scoring e interpretazione

Ogni item è valutato su una scala di frequenza da 0 (mai) a 10 (ogni giorno o costantemente presente). I punteggi di ciascun criterio del DSM vengono sommati per ottenere un punteggio totale che indica la gravità complessiva del disturbo. Sono disponibili anche i punteggi per dimensione.