CADDRA

Lista di valutazione dell'ADHD della CADDRA (CADDRA)

L'ADHD Assessment Checklist della CADDRA è uno strumento clinico per individuare il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e strutturarne la valutazione. Utilizzata nell'ambito delle linee guida canadesi, aiuta lo psicologo o il clinico a passare in rassegna i sintomi principali dell'ADHD secondo i criteri diagnostici attuali, nonché il loro impatto funzionale nei diversi contesti di vita. Lo strumento si inserisce in un approccio multimodale che comprende il colloquio clinico, la storia dello sviluppo, lo screening delle comorbilità e, se possibile, le informazioni fornite da familiari, insegnanti o altri professionisti. È particolarmente utile per standardizzare l'esame dei sintomi di disattenzione e di iperattività-impulsività, ma non va interpretata come uno strumento diagnostico autonomo. Nella pratica clinica, la checklist CADDRA è utilizzata soprattutto per supportare la valutazione iniziale e la documentazione strutturata dell'ADHD in bambini, adolescenti e adulti.

Numero di domande	18 domande
Durata stimata	10 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	ADHD Assessment Checklist
Destinatari	Dai bambini agli adulti
Autori	Canadian ADHD Resource Alliance (2006)
Categoria	ADHD

Scoring e interpretazione

La checklist comprende i 18 sintomi principali dell'ADHD, generalmente valutati su una scala di frequenza o di gravità. Nella pratica, le risposte che corrispondono a una presenza frequente del sintomo sono considerate clinicamente significative. L'interpretazione si basa sul numero di sintomi di disattenzione e/o di iperattività-impulsività presenti, con una soglia abituale di 6 sintomi per dominio nei bambini e negli adolescenti e di 5 sintomi per dominio a partire dai 17 anni. L'interpretazione deve tenere conto anche della compromissione funzionale, della presenza delle difficoltà in almeno due contesti, della loro persistenza nel corso dello sviluppo e della diagnosi differenziale. La checklist da sola non è sufficiente per porre una diagnosi.