


# Lista di controllo del disturbo da stress post-traumatico, versione specifica (PCL-S)

La PCL-S serve per lo screening del disturbo da stress post-traumatico (PTSD). È stata creata nel 1993 da Weathers F.W. et al. sulla base dei criteri diagnostici del DSM-IV. Deriva dalla PCL-C (versione civile) e dalla PCL-M (versione militare), ma si concentra su un evento specifico.

| | |
|---|---|
| Numero di domande | 17 domande |
| Durata stimata | 4 minuti |
| Lingua | Italiano |
| Nome originale | Posttraumatic Checklist Scale |
| Categoria | PTSD |

## Anteprima delle 17 domande

Ricordi, pensieri o immagini ripetuti e disturbanti dell'esperienza stressante?

Per niente | Un poco | Moderatamente | Parecchio | Estremamente

Sogni ripetuti e disturbanti dell'esperienza stressante?

Per niente | Un poco | Moderatamente | Parecchio | Estremamente

Agire o sentire improvvisamente come se l'esperienza stressante stesse accadendo di nuovo (come se la stesse rivivendo)?

Per niente | Un poco | Moderatamente | Parecchio | Estremamente

Sentirsi molto turbato/a quando qualcosa le ricordava l'esperienza stressante?

Per niente | Un poco | Moderatamente | Parecchio | Estremamente

Avere reazioni fisiche (per es. battito cardiaco accelerato, difficoltà a respirare o sudorazione) quando qualcosa le ricordava l'esperienza stressante?

Per niente | Un poco | Moderatamente | Parecchio | Estremamente


### Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

## Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis | Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Il calcolo automatico dei punteggi mi fa risparmiare tantissimo tempo e i miei pazienti sono molto più propensi a compilare i questionari.”

Samia T. - Psicologa online