


Scala diagnostica di Ritvo per l'autismo e l'Asperger (RAADS-R)

La RAADS-R è una scala di screening che supporta la diagnosi di autismo negli adulti, in particolare nelle persone con sintomi compatibili con la sindrome di Asperger o con un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Mira a individuare difficoltà nelle aree dell'interazione sociale, della comunicazione, degli interessi ristretti e dei comportamenti sensoriali atipici.

Numero di domande	80 domande
Durata stimata	20 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale
Destinatari	Adulti
Autori	Riva Ariella Ritvo, Edward Ritvo, Thomas J. Guthrie, Irene S. Ritvo (2011)
Categoria	Spettro autistico

Anteprima delle 80 domande

Mi considero una persona empatica.

Vero adesso e quando ero più giovane | Vero solo adesso | Vero solo prima dei 16 anni | Mai vero

Uso spesso nelle conversazioni parole o espressioni sentite in film, serie o in televisione.

Vero adesso e quando ero più giovane | Vero solo adesso | Vero solo prima dei 16 anni | Mai vero

Sono spesso sorpreso/a quando altri mi dicono che il mio comportamento può essere sembrato scortese.

Vero adesso e quando ero più giovane | Vero solo adesso | Vero solo prima dei 16 anni | Mai vero

Mi capita di parlare troppo forte o troppo piano senza rendermene conto.

Vero adesso e quando ero più giovane | Vero solo adesso | Vero solo prima dei 16 anni | Mai vero

Spesso faccio fatica a capire come comportarmi nei contesti sociali.

Vero adesso e quando ero più giovane | Vero solo adesso | Vero solo prima dei 16 anni | Mai vero

Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

Scoring e interpretazione

Calcolo del punteggio

Ogni item ha un punteggio da 0 a 3: "Vero ora e quando ero giovane" = 3, "Vero solo ora" = 2, "Vero solo prima dei 16 anni" = 1, "Mai vero" = 0. I 17 item formulati nella direzione del funzionamento tipico (1, 6, 11, 18, 23, 26, 33, 37, 43, 47, 48, 53, 58, 62, 68, 72, 77) sono a punteggio invertito.

Il punteggio totale va da 0 a 240 e si suddivide in quattro sottoscale:

- Relazioni sociali: 39 item, da 0 a 117
- Interessi circoscritti: 14 item, da 0 a 42
- Linguaggio: 7 item, da 0 a 21
- Sensomotoria: 20 item, da 0 a 60

Interpretazione del punteggio totale

- Sotto 65: generalmente non compatibile con l'autismo
- Da 65 a 105: alcuni tratti autistici, senza un livello chiaramente compatibile con l'autismo
- Da 106 a 139: generalmente compatibile con l'autismo; indicata una valutazione diagnostica approfondita
- 140 e oltre: tratti autistici marcati; indicata una valutazione diagnostica approfondita

Origine dei cut-off

- 65 è il cut-off dello studio di validazione originale (Ritvo et al., 2011: 201 adulti autistici, 578 adulti non autistici).
- 106 e 140 provengono dalla revisione NovoPsych (Hegarty et al., 2025). Sono stati ottenuti tramite analisi ROC su 37.620 persone che hanno compilato la RAADS-R e l'AQ, usando come criterio i cut-off dell'AQ (26 e 36) anziché una diagnosi clinica. Si tratta di un report tecnico, non pubblicato su una rivista con revisione paritaria.
- I cut-off delle sottoscale provengono dalla stessa revisione (compatibile / marcato): relazioni sociali 49 / 64, interessi circoscritti 20 / 28, linguaggio 8 / 11, sensomotoria 26 / 38. Sono allineati ai percentili del punteggio totale e non sono stati validati separatamente.
- Tutti questi cut-off sono stati stabiliti sulla versione inglese. Nessuno proviene da una validazione in lingua francese.

Traduzione La versione proposta è una traduzione realizzata a partire dalla scala originale di Ritvo et al. (2011). Non è stata validata.

Limiti Il cut-off di 65 produce molti falsi positivi nelle popolazioni cliniche: l'81,5% del campione clinico NovoPsych lo supera, la validazione francese (Picot et al., 2021) riporta il 55,6% di falsi positivi tra adulti con altri disturbi psichiatrici e uno studio su adulti inviati per sospetto ASD (Jones et al., 2021) rileva una specificità molto bassa. È ciò che ha motivato i cut-off più alti di NovoPsych. Un punteggio elevato indica che è opportuna una valutazione diagnostica approfondita, ma

non costituisce una diagnosi. Al contrario, una persona che compensa o maschera fortemente i propri tratti può ottenere un punteggio basso.

Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis

Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Valutazioni affidabili e pertinenti per comprendere meglio lo stato psicologico dei miei pazienti”

 Benjamin G. - Psicologo del lavoro