

Intervista clinica strutturata per i disturbi dissociativi del DSM (SCID-D)

La SCID-D è un'intervista clinica semistrutturata che permette di valutare la presenza e la gravità dei disturbi dissociativi secondo i criteri del DSM. È utilizzata per identificare diversi aspetti della dissociazione, tra cui amnesia, depersonalizzazione, derealizzazione, confusione e identità dissociativa, facilitando la diagnosi differenziale con altri disturbi psicologici.

Numero di domande	276 domande
Durata stimata	90 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders
Destinatari	Adulti, adolescenti
Autori	Marlene Steinberg (1994)
Categoria	Disturbi dissociativi

Scoring e interpretazione

L'intervista permette di valutare ciascun sintomo in base alla frequenza e alla gravità. La valutazione si svolge con l'ausilio di una guida specifica: ogni dominio dissociativo viene analizzato separatamente e poi integrato in un'impressione diagnostica complessiva secondo i criteri del DSM.

Utilizzo

Questo strumento non è disponibile su Mentaal. Per usare questo questionario nella tua pratica devi disporre di una licenza d'uso valida. Ti invitiamo a inviarlo direttamente dal sito dell'editore.