

Selvvurdering av vansker med sosial kognisjon (ACSo)

ACSo er et kort selvrapporteringsskjema om sosial kognisjon som identifiserer subjektive plager i hverdagen. Det utforsker fire områder som er klinisk nyttige i psykologi og psykiatri: attribusjonsskjevheter, sosial persepsjon og kunnskap, emosjonelle prosesser og mentaliseringsevne. Skjemaet er utviklet på fransk i et transdiagnostisk perspektiv og brukes hovedsakelig hos voksne med en psykisk lidelse eller en nevroutviklingsforstyrrelse med sosiokognitive konsekvenser, særlig schizofreni, bipolar lidelse eller autismespekterforstyrrelse. Hovedverdien er at det tilfører den objektive kartleggingen et mål på pasientens subjektive opplevelse, noe som er nyttig for å forberede psykososial rehabilitering, målrette terapeutiske mål og følge endringer i opplevde vansker.

Antall spørsmål	12 spørsmål
Estimert tid	5 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Self-Assessment of Social Cognition Impairments
Målgruppe	Voksne
Forfattere	Jérôme Graux, Alix Thillay, Vivien Morlec, Pierre-Yves Sarron, Sylvie Roux, Baptiste Gaudelus, Zelda Prost, Lindsay Brénugat-Herné, Isabelle Amado, Shasha Morel-Kohlmeyer, Emmanuelle Houy-Durand, Nicolas Franck, Isabelle Carteau-Martin, Charlotte Danset-Alexandre, Elodie Peyroux (2019)
Kategori	Autismespekteret

Forhåndsvisning av de 12 spørsmålene

Jeg har vansker med å gjenkjenne andres følelser (sinne, frykt, tristhet ...).

0 - Aldri | 1 | 2 | 3 | 4 - Svært ofte

Jeg har vansker med å forstå ting som ikke er ment bokstavelig (for eksempel en spøk).

0 - Aldri | 1 | 2 | 3 | 4 - Svært ofte

Jeg har vansker med å vurdere om noe er høflig eller uhøflig.

0 - Aldri | 1 | 2 | 3 | 4 - Svært ofte

Jeg har en tendens til å tro at folk gjør ting med vilje for å skade meg, eller at de er fiendtlige mot meg.

0 - Aldri | 1 | 2 | 3 | 4 - Svært ofte

Jeg mangler takt overfor andre (for eksempel kan jeg såre dem rundt meg uten å mene det når jeg sier min mening).

0 - Aldri | 1 | 2 | 3 | 4 - Svært ofte

Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres fra 0 til 4, fra aldri til svært ofte. Totalskåren er summen av de 12 leddene, med en variasjonsbredde fra 0 til 48. Høyere skår indikerer flere subjektive plager knyttet til sosial kognisjon. Delskårer kan beregnes etter den validerte faktorløsningen: attribusjonsskjevheter for ledd 4, 7 og 12; sosial persepsjon og kunnskap for ledd 3, 8 og 9; emosjonelle prosesser for ledd 1 og 10; mentaliseringsevne for ledd 2, 6 og 11. Ledd 5 inngår i totalskåren, men ikke i delskårene. I den opprinnelige studien skilte en cut-off-verdi på 13 godt mellom pasienter og kontrollpersoner, men den bør ikke tolkes som en diagnostisk cut-off-verdi.

Bruk

Dette verktøyet er ikke tilgjengelig på Mentaal. For å bruke dette spørreskjemaet i praksisen din må du ha en gyldig lisens. Vi anbefaler at du sender det direkte fra utgiverens nettsted.

Gå til utgiverens nettsted