BNSS

Kort skala for negative symptomer (BNSS)

BNSS er en kort klinikervurdert skala, administrert som et semistrukturert intervju, for kartlegging av negative symptomer ved schizofreni og schizoaffektive lidelser. Den utforsker de fem områdene som nå regnes som sentrale i denne symptomatologien, nemlig anhedoni, asosialitet, avolisjon, avflatet affekt og alogi, med et tilleggsledd om fravær av normalt ubehag. Verktøyet ble utformet for å samsvare bedre med dagens forståelse av negative symptomer enn eldre skalaer, og samtidig være kort nok for klinisk praksis og forskning. Det er særlig nyttig for å måle samlet alvorlighetsgrad objektivt, skille mellom dimensjonene motivasjon-glede og emosjonelt uttrykk, følge endringer under behandling og dokumentere pasientens symptomprofil i detalj.

Antall spørsmål	13 spørsmål
Estimert tid	12 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Brief Negative Symptom Scale
Målgruppe	Voksne
Forfattere	Brian Kirkpatrick, Gregory P. Strauss, Linh Nguyen, Bernard A. Fischer, David G. Daniel, Angel Cienfuegos, Stephen R. Marder (2010)
Kategori	Psykoselidelser

Forhåndsvisning av de 13 spørsmålene

Intensitet av glede under aktiviteter

Delskala: Anhedoni

0 - Fraværende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Alvorlig

Hyppighet av glede under aktiviteter

Delskala: Anhedoni

0 - Fraværende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Alvorlig

Intensitet av forventet glede ved fremtidige aktiviteter

Delskala: Anhedoni

0 - Fraværende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Alvorlig

Ubehag

Delskala: Ubehag (manglende normalt ubehag)

0 - Fraværende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Alvorlig

Asosialitet: atferd

Delskala: Asosialitet

0 - Fraværende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Alvorlig

Skåring og tolkning

Hvert ledd vurderes fra 0 til 6 ut fra intervjuet, observert atferd og informasjon som hovedsakelig gjelder de siste 7 dagene. Totalskåren er summen av de 13 leddene og ligger mellom 0 og 78. Delskårer kan beregnes for anhedoni, asosialitet, avolisjon, avflatet affekt, alogi og fravær av ubehag. Høyere skår indikerer mer alvorlig negativ symptomatologi. Leddet om ubehag tolkes som en reduksjon i normalt ubehag. Det finnes ingen allment akseptert diagnostisk cut-off-verdi, så tolkningen bygger på samlet alvorlighetsgrad, profilen på deldimensjonene og den kliniske konteksten.