

Sjekkliste for posttraumatisk stresslidelse, spesifikk versjon (PCL-S)

PCL-S brukes til screening for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det ble laget i 1993 av Weathers F.W. og medarbeidere, basert på de diagnostiske kriteriene i DSM-IV. Det er avledet av PCL-C (sivil versjon) og PCL-M (militær versjon), men retter seg mot én bestemt hendelse.

Antall spørsmål	17 spørsmål
Estimert tid	4 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Posttraumatic Checklist Scale
Kategori	PTSD

Forhåndsvisning av de 17 spørsmålene

Gjentatte, forstyrrende minner, tanker eller bilder av den stressende opplevelsen?

Ikke i det hele tatt | Litt | Moderat | Ganske mye | Ekstremt

Gjentatte, forstyrrende drømmer om den stressende opplevelsen?

Ikke i det hele tatt | Litt | Moderat | Ganske mye | Ekstremt

Plutselig å handle eller føle som om den stressende opplevelsen skjedde igjen (som om du gjenopplevde den)?

Ikke i det hele tatt | Litt | Moderat | Ganske mye | Ekstremt

Å bli svært opprørt når noe minnet deg om den stressende opplevelsen?

Ikke i det hele tatt | Litt | Moderat | Ganske mye | Ekstremt

Å få fysiske reaksjoner (f.eks. hjertebank, pustevansker eller svetting) når noe minnet deg om den stressende opplevelsen?

Ikke i det hele tatt | Litt | Moderat | Ganske mye | Ekstremt

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

“Mentaal har virkelig forenklet praksisen min på nett, takket være automatisk skåring og smidig utsending av skjemaer.”

 Basile R. - Klinisk psykolog