


Ritvos diagnostiske skala for autisme og Asperger (RAADS-R)

RAADS-R er en screeningskala som skal støtte diagnostisering av autisme hos voksne, særlig hos personer med symptomer som er forenlige med Aspergers syndrom eller høytfungerende autismespekterforstyrrelse. Den har som mål å identifisere vansker innen sosial samhandling, kommunikasjon, begrensede interesser og atypisk sensorisk atferd.

Antall spørsmål	80 spørsmål
Estimert tid	20 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale
Målgruppe	Voksne
Forfattere	Riva Ariella Ritvo, Edward Ritvo, Thomas J. Guthrie, Irene S. Ritvo (2011)
Kategori	Autismespekteret

Forhåndsvisning av de 80 spørsmålene

Jeg ser på meg selv som en empatisk person.

Stemmer nå og da jeg var yngre | Stemmer bare nå | Stemmer bare før jeg var 16 år | Har aldri stemt

I samtaler bruker jeg ofte ord eller uttrykk jeg har plukket opp fra filmer, serier eller TV.

Stemmer nå og da jeg var yngre | Stemmer bare nå | Stemmer bare før jeg var 16 år | Har aldri stemt

Jeg blir ofte overrasket når andre sier at oppførselen min kan ha virket uhøflig.

Stemmer nå og da jeg var yngre | Stemmer bare nå | Stemmer bare før jeg var 16 år | Har aldri stemt

Noen ganger snakker jeg for høyt eller for lavt uten å være klar over det.

Stemmer nå og da jeg var yngre | Stemmer bare nå | Stemmer bare før jeg var 16 år | Har aldri stemt

Jeg synes ofte det er vanskelig å vite hvordan jeg skal oppføre meg i sosiale sammenhenger.

Stemmer nå og da jeg var yngre | Stemmer bare nå | Stemmer bare før jeg var 16 år | Har aldri stemt

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Skåring

Hvert ledd skåres fra 0 til 3: «Stemmer nå og da jeg var ung» = 3, «Stemmer bare nå» = 2, «Stemmer bare da jeg var yngre enn 16 år» = 1, «Har aldri stemt» = 0. De 17 leddene som er formulert i retning av typisk fungering (1, 6, 11, 18, 23, 26, 33, 37, 43, 47, 48, 53, 58, 62, 68, 72, 77), skåres omvendt.

Totalskåren varierer fra 0 til 240 og er delt inn i fire delskalaer:

- Sosial relasjonsevne: 39 ledd, fra 0 til 117
- Avgrensede interesser: 14 ledd, fra 0 til 42
- Språk: 7 ledd, fra 0 til 21
- Sensorimotorikk: 20 ledd, fra 0 til 60

Tolkning av totalskåren

- Under 65: vanligvis ikke forenlig med autisme
- 65 til 105: noen autistiske trekk, uten et nivå som er klart forenlig med autisme
- 106 til 139: vanligvis forenlig med autisme; grundig diagnostisk utredning er indisert
- 140 og over: markante autistiske trekk; grundig diagnostisk utredning er indisert

Opprinnelsen til terskelverdiene

- 65 er cut-off-verdien fra den opprinnelige valideringsstudien (Ritvo et al., 2011: 201 autistiske voksne, 578 ikke-autistiske voksne).
- 106 og 140 kommer fra NovoPsych-revisjonen (Hegarty et al., 2025). De ble funnet ved ROC-analyse av 37 620 personer som fylte ut RAADS-R og AQ, med AQ-cut-off-verdiene (26 og 36) som kriterium i stedet for en klinisk diagnose. Dette arbeidet er en teknisk rapport og er ikke publisert i et fagfellevurdert tidsskrift.
- Terskelverdiene for delskalaene kommer fra den samme revisjonen (forenlig / markant): sosial relasjonsevne 49 / 64, avgrensede interesser 20 / 28, språk 8 / 11, sensorimotorikk 26 / 38. De er tilpasset persentilene for totalskåren og er ikke validert separat.
- Alle disse terskelverdiene er fastsatt på den engelske versjonen. Ingen av dem stammer fra en validering på fransk.

Oversettelse Versjonen som tilbys, er en oversettelse av den opprinnelige skalaen til Ritvo et al. (2011). Den er ikke validert.

Begrensninger Cut-off-verdien på 65 gir mange falske positive i kliniske populasjoner: 81,5 % av det kliniske utvalget hos NovoPsych overstiger den, den franske valideringen (Picot et al., 2021) rapporterer 55,6 % falske positive blant voksne med andre psykiatriske lidelser, og en studie av voksne henvist ved mistanke om ASF (Jones et al., 2021) finner svært lav spesifisitet. Det var dette som motiverte de høyere terskelverdiene fra NovoPsych. En høy skår viser at en grundig

diagnostisk utredning er relevant; den utgjør ikke en diagnose. Omvendt kan en person som i stor grad kompenserer for eller maskerer trekkene sine, få en lav skår.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis

Se alle spørreskjemaene

★★★★★

“Det er et virkelig pluss i timene når jeg skal vurdere pasienten, og et svært rikt grunnlag for samtaler som utdyper det kliniske arbeidet.”



Ingrid M. - KAT-psykolog