


Strukturert klinisk intervju for dissosiative lidelser i DSM (SCID-D)

SCID-D er et semistrukturert klinisk intervju for å kartlegge forekomst og alvorlighetsgrad av dissosiative lidelser etter DSM-kriteriene. Det brukes til å identifisere ulike sider ved dissosiasjon, blant annet amnesi, depersonalisering, derealisering, forvirring og dissosiativ identitet, noe som letter differensialdiagnostikk opp mot andre psykiske lidelser.

Antall spørsmål	276 spørsmål
Estimert tid	90 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders
Målgruppe	Voksne, ungdom
Forfattere	Marlene Steinberg (1994)
Kategori	Dissosiative lidelser

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Intervjuet gjør det mulig å vurdere hvert symptom etter hyppighet og alvorlighetsgrad. Kartleggingen gjøres ved hjelp av en egen veiledning: hvert dissosiativt område analyseres separat og settes deretter sammen til et samlet diagnostisk inntrykk etter DSM-kriteriene.

Bruk

Dette verktøyet er ikke tilgjengelig på Mentaal. For å bruke dette spørreskjemaet i praksisen din må du ha en gyldig lisens. Vi anbefaler at du sender det direkte fra utgiverens nettsted.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

"Jeg har brukt Mentaal i 2 måneder nå, og dette verktøyet har revolusjonert både synet mitt på behandling og timeplanen min!"

 Romane L. - KAT-psykolog på nett