

Vanderbilts diagnostiske vurderingsskala for ADHD (VADRS)

Vanderbilts diagnostiske vurderingsskala for ADHD (VADRS) er et strukturert spørreskjema som hovedsakelig brukes i skole og klinikk for å kartlegge symptomer på ADHD hos barn og ungdom etter DSM-kriteriene. Det kan også screene for andre samtidige lidelser (opposisjonell atferd, angst, depresjon). Det finnes en foreldreversjon og en lærerversjon.

Antall spørsmål	55 spørsmål
Estimert tid	10 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale
Målgruppe	Barn, ungdom
Forfattere	Mark L. Wolraich, et al. (1998)
Kategori	ADHD, Barn

Forhåndsvisning av de 55 spørsmålene

Er ikke oppmerksom på detaljer eller gjør slurvefeil, for eksempel i lekser

Aldri | Av og til | Ofte | Svært ofte

Har vansker med å holde oppmerksomheten på det som skal gjøres

Aldri | Av og til | Ofte | Svært ofte

Ser ikke ut til å høre etter når noen snakker direkte til barnet

Aldri | Av og til | Ofte | Svært ofte

Følger ikke instruksjoner og fullfører ikke oppgaver

Aldri | Av og til | Ofte | Svært ofte

Har vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter

Aldri | Av og til | Ofte | Svært ofte

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres fra 0 (aldri) til 3 (svært ofte). Det fastsettes en cut-off-verdi for hver delskala (uoppmerksomhet, hyperaktivitet/impulsivitet, atferdsforstyrrelse). Tolkningen bygger på antall symptomer som når den minste påkrevde hyppigheten, i samsvar med DSM-5-kriteriene.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

“Mentaal er blitt en uunnværlig hjelp til å strukturere kartleggingene mine og få en dypere klinisk forståelse av pasientene mine.”

Nolwenn P. - KAT-psykolog