


Interviewschema voor angststoornissen en verwante stoornissen volgens de DSM-5 (ADIS-5)

Het ADIS-5 is een toonaangevend semigestructureerd diagnostisch interview dat psychologen en andere clinici gebruiken om angststoornissen en verwante stoornissen volgens de DSM-5-criteria te beoordelen. Het maakt een diepgaande verkenning mogelijk van symptomen, differentiële diagnose, comorbiditeit, vermijding, subjectieve lijdensdruk en functionele impact. Het instrument wordt veel gebruikt in de gespecialiseerde klinische praktijk en in onderzoek en helpt betrouwbare diagnoses te stellen, klinische problemen te prioriteren en behandelbeslissingen te onderbouwen. Dankzij de modulaire opbouw kan de afname worden afgestemd op de aanwezige symptomen, wat het tot een bijzonder relevant instrument maakt voor een volledige beoordeling van angststoornissen bij volwassenen.

Aantal vragen	120 vragen
Geschatte duur	90 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Categorie	Angst

Voorbeeld van de 120 vragen

Onderdeel paniekstoornis:

Bezorgdheid over toekomstige aanvallen

0 - Geen | 1 | 2 - Licht | 3 | 4 - Matig | 5 | 6 - Ernstig | 7 | 8 - Zeer ernstig

Onderdeel paniekstoornis:

Situationele vermijding

0 - Geen | 1 | 2 - Licht | 3 | 4 - Matig | 5 | 6 - Ernstig | 7 | 8 - Zeer ernstig

Onderdeel paniekstoornis:

Interoceptieve gevoeligheid/vermijding

0 - Geen | 1 | 2 - Licht | 3 | 4 - Matig | 5 | 6 - Ernstig | 7 | 8 - Zeer ernstig

Onderdeel paniekstoornis:

Veiligheidssignalen

0 - Geen | 1 | 2 - Licht | 3 | 4 - Matig | 5 | 6 - Ernstig | 7 | 8 - Zeer ernstig

Onderdeel paniekstoornis:

Afleiding

0 - Geen | 1 | 2 - Licht | 3 | 4 - Matig | 5 | 6 - Ernstig | 7 | 8 - Zeer ernstig

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

De clinicus neemt een semigestructureerd interview af, toetst voor elke onderzochte stoornis de diagnostische criteria van de DSM-5 en kent een ernstbeoordeling door de clinicus (Clinician Severity Rating, CSR) toe van 0 tot 8. Een CSR van 4 of hoger wordt doorgaans beschouwd als een aanwijzing voor een klinisch significante stoornis. De interpretatie berust op de aanwezigheid van de criteria, de intensiteit van de symptomen, de chroniciteit, de vermijding, de functionele beperkingen en de comorbiditeit. Het aantal vragen varieert afhankelijk van de afgenomen modules.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Naar de website van de uitgever ›

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Mentaal heeft mijn online praktijk echt eenvoudiger gemaakt, dankzij de automatische scoring en het vlot versturen van de vragenlijsten.”

 Basile R. - Klinisch psycholoog