ASBPD

Ardouin-gedragsschaal bij de ziekte van Parkinson (ASBPD)

De ASBPD is een gestandaardiseerd klinisch interview over stemmings-, motivatie- en gedragsstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Het helpt hypodopaminerge en hyperdopaminerge uitingen, niet-motorische fluctuaties en diverse impulsieve of verslavingsgedragingen in verband met de ziekte of de behandeling ervan op te sporen en te volgen. Het instrument is vooral nuttig in de neuropsychologie en de multidisciplinaire praktijk om symptomen objectief vast te stellen die vaak niet spontaan worden gemeld, de beoordeling vóór een aanpassing van de behandeling te verfijnen en veranderingen tijdens de follow-up vast te leggen.

Aantal vragen	21 vragen
Geschatte duur	60 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease
Doelgroep	Volwassenen met de ziekte van Parkinson
Auteurs	Claire Ardouin, Isabelle Chéreau, Pierre-Michel Llorca, Estelle Lhommée, Franck Durif, Pierre Pollak, Paul Krack (2009)

Voorbeeld van de 21 vragen

In de afgelopen maand, vergeleken met de gebruikelijke toestand van de patiënt:

Depressieve stemming

0 - Geen verandering | 1 - Licht | 2 - Matig | 3 - Duidelijk | 4 - Ernstig

In de afgelopen maand, vergeleken met de gebruikelijke toestand van de patiënt:

Hypomane of manische stemming

0 - Geen verandering | 1 - Licht | 2 - Matig | 3 - Duidelijk | 4 - Ernstig

In de afgelopen maand, vergeleken met de gebruikelijke toestand van de patiënt:

Angst

0 - Geen verandering | 1 - Licht | 2 - Matig | 3 - Duidelijk | 4 - Ernstig

In de afgelopen maand, vergeleken met de gebruikelijke toestand van de patiënt:

Prikkelbaarheid, agressiviteit

0 - Geen verandering | 1 - Licht | 2 - Matig | 3 - Duidelijk | 4 - Ernstig

In de afgelopen maand, vergeleken met de gebruikelijke toestand van de patiënt:

Hyperemotionaliteit

0 - Geen verandering | 1 - Licht | 2 - Matig | 3 - Duidelijk | 4 - Ernstig

Scoring en interpretatie

Het interview onderzoekt de symptomen in de afgelopen maand. Elk item wordt gescoord van 0 tot 4 volgens intensiteit en frequentie, van geen klinisch opvallende verandering tot ernstige uiting. De interpretatie berust vooral op het profiel per item en op de thematische subschaalscores, en niet op één globale afkapwaarde. In de praktijk is een itemscore van 2 of hoger een klinisch waarschuwingssignaal dat op een significante gedragsverandering wijst, die moet worden besproken in de neurologische, psychiatrische en therapeutische context.