

Screeningsvragenlijst voor het autismespectrum (ASSQ)

De ASSQ is een screeningsinstrument om kenmerken van een autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen en adolescenten te herkennen. De vragenlijst wordt meestal ingevuld door ouders of leerkrachten die het kind goed kennen. Het instrument helpt vroege signalen die op ASS wijzen op te sporen, zodat gericht kan worden doorverwezen voor uitgebreid onderzoek.

Aantal vragen	27 vragen
Geschatte duur	6 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Autism Spectrum Screening Questionnaire
Doelgroep	Kinderen, adolescenten
Auteurs	Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L (1999)
Categorie	Autismespectrum, Kinderen

Voorbeeld van de 27 vragen

Het kind verschilt op de volgende manier van andere kinderen van dezelfde leeftijd:

Is ‘ouderwets’ of vroegwijs

Nee | Een beetje | Ja

Het kind verschilt op de volgende manier van andere kinderen van dezelfde leeftijd:

Wordt door andere kinderen gezien als een ‘excentrieke professor’

Nee | Een beetje | Ja

Het kind verschilt op de volgende manier van andere kinderen van dezelfde leeftijd:

Leeft een beetje in een eigen wereld, met beperkte en ongewone intellectuele interesses

Nee | Een beetje | Ja

Het kind verschilt op de volgende manier van andere kinderen van dezelfde leeftijd:

Verzamelt kennis over bepaalde onderwerpen (goed geheugen), maar begrijpt niet echt wat die betekent

Nee | Een beetje | Ja

Het kind verschilt op de volgende manier van andere kinderen van dezelfde leeftijd:

Vat dubbelzinnige en figuurlijke taal letterlijk op

Het kind neemt bijvoorbeeld dingen letterlijk en heeft moeite met beeldspraak of metaforen

Nee | Een beetje | Ja

Scoring en interpretatie

Elk item wordt beoordeeld op een schaal van 0 (niet van toepassing), 1 (enigszins van toepassing) of 2 (zeker van toepassing). De totaalscore (0-54) wordt verkregen door de antwoorden op te tellen.

Interpretatie van de totaalscore:

- **0-10**: Niet significant
- **11-18**: Matig passend bij ASS; er zijn ontwikkelingsverschillen aanwezig, die kunnen wijzen op ASS of op andere aandoeningen (ADHD, gedragsstoornissen)
- **19-54**: Sterk passend bij ASS; aanzienlijke verschillen in sociaal en gedragsmatig functioneren

Subschalen (Junttila et al., 2023):

Vier subschalen helpen de meest uitgesproken domeinen te herkennen:

- **Formele stijl** (items 1, 2, 6): formele/ouderwetse stijl van denken, voorkomen of communiceren
- **Contextbegrip en routines** (items 4, 5, 7, 10, 11, 13, 23, 24): moeite met het begrijpen van de context en voorkeur voor routines
- **Sociaal-emotionele wederkerigheid** (items 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25): betrokkenheid bij sociale interacties en emotionele uitwisselingen
- **Vocalisatie, beweging en voorkomen** (items 3, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 26, 27): atypische vocalisaties, motorisch gedrag en fysieke kenmerken

De afkapwaarden van de subschalen zijn afgeleid van de afkapwaarden van de totaalscore, gedeeld door 27 items:

- **Gemiddelde score ≥ 0,41** (11/27): Matig
- **Gemiddelde score ≥ 0,70** (19/27): Hoog

Een hoge score wijst op een verhoogde kans op ASS, maar de score alleen volstaat niet voor een formele diagnose.