Korte schaal voor negatieve symptomen (BNSS)

BNSS

De BNSS is een korte schaal die door de clinicus wordt ingevuld en als semigestructureerd interview wordt afgenomen, om de negatieve symptomen van schizofrenie en schizoaffectieve stoornissen te beoordelen. De schaal onderzoekt de vijf domeinen die tegenwoordig als kern van deze symptomatologie worden beschouwd, namelijk anhedonie, asocialiteit, avolitie, vervlakt affect en alogie, met een extra item over het ontbreken van normale onlust. Het instrument werd ontworpen om beter aan te sluiten bij de hedendaagse opvattingen over negatieve symptomen dan oudere schalen, en toch kort genoeg te blijven voor de klinische praktijk en onderzoek. Het is vooral nuttig om de algemene ernst objectief te meten, de dimensies motivatie-plezier en emotionele expressie te onderscheiden, veranderingen tijdens de behandeling te volgen en het symptoomprofiel van een patiënt gedetailleerd vast te leggen.

Aantal vragen	13 vragen
Geschatte duur	12 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Brief Negative Symptom Scale
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	Brian Kirkpatrick, Gregory P. Strauss, Linh Nguyen, Bernard A. Fischer, David G. Daniel, Angel Cienfuegos, Stephen R. Marder (2010)
Categorie	Psychotische stoornissen

Voorbeeld van de 13 vragen

Intensiteit van plezier tijdens activiteiten

Subschaal: Anhedonie

0 - Afwezig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Ernstig

Frequentie van plezier tijdens activiteiten

Subschaal: Anhedonie

0 - Afwezig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Ernstig

Intensiteit van verwacht plezier van toekomstige activiteiten

Subschaal: Anhedonie

0 - Afwezig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Ernstig

Distress

Subschaal: Distress (gebrek aan normale distress)

0 - Afwezig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Ernstig

Asocialiteit: gedrag

Subschaal: Asocialiteit

0 - Afwezig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Ernstig

Scoring en interpretatie

Elk item wordt gescoord van 0 tot 6 op basis van het interview, het waargenomen gedrag en informatie die vooral betrekking heeft op de afgelopen 7 dagen. De totaalscore is de som van de 13 items en ligt tussen 0 en 78. Er kunnen subschaalscores worden berekend voor anhedonie, asocialiteit, avolitie, vervlakt affect, alogie en ontbreken van onlust. Een hogere score wijst op ernstiger negatieve symptomatologie. Het onlustitem wordt geïnterpreteerd als een vermindering van normale onlust. Er bestaat geen algemeen aanvaarde diagnostische afkapwaarde, zodat de interpretatie berust op de algemene ernst, het profiel over de subdimensies en de klinische context.