BPDSI

Ernstindex voor de borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPDSI)

De BPDSI is een semigestructureerd interview om de ernst van de symptomen van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis in de afgelopen drie maanden te beoordelen. Het levert een kwantitatieve meting van de belangrijkste klinische uitingen van de stoornis volgens de DSM-criteria, waardoor veranderingen in de symptomen gemakkelijker te volgen zijn en de effectiviteit van de behandeling kan worden geëvalueerd.

Aantal vragen	70 vragen
Geschatte duur	40 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Borderline Personality Disorder Severity Index
Doelgroep	Volwassenen met een vermoeden van borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Auteurs	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Categorie	Persoonlijkheidsstoornissen

Voorbeeld van de 70 vragen

Werd u er de afgelopen 3 maanden wel eens wanhopig van als u dacht dat iemand om wie u gaf u zou gaan verlaten?

Bij positief scoren zijn duidelijke voorbeelden nodig.

0 - Nooit | 1 - 1 x per 3 maanden | 2 - 2 x per 3 maanden | 3 - 3 x per 3 maanden / 1 x per maand | 4 - 4 à 5 x per 3 maanden / 1 x per 3 weken | 5 - 6 à 7 x per 3 maanden / 1 x per 2 weken | 6 - 8 à 10 x per 3 maanden / 2 x per 3 weken | 7 - 1 x per week / 11 à 15 x per 3 maanden | 8 - Meerdere malen per week, maar minder dan de helft van de week | 9 - Meer dan de helft van de week / bijna elke dag | 10 - Dagelijks

Heeft u de afgelopen 3 maanden iemand die belangrijk voor u was en die bij u weg wilde (of van wie u dacht dat die weg wilde) op een fanatieke manier bij u proberen te houden?

Bijvoorbeeld continu bellen, controleren, verleiden e.d.; alleen overdreven, krampachtige manieren scoren. Het gaat om echte en ingebeelde verlatingen; bij positief scoren zijn duidelijke voorbeelden van de pogingen nodig.

0 - Nooit | 1 - 1 x per 3 maanden | 2 - 2 x per 3 maanden | 3 - 3 x per 3 maanden / 1 x per maand | 4 - 4 à 5 x per 3 maanden / 1 x per 3 weken | 5 - 6 à 7 x per 3 maanden / 1 x per 2 weken | 6 - 8 à 10 x per 3 maanden / 2 x per 3 weken | 7 - 1 x per week / 11 à 15 x per 3 maanden | 8 - Meerdere malen per week, maar minder dan de helft van de week | 9 - Meer dan de helft van de week / bijna elke dag | 10 - Dagelijks

Kwam het de afgelopen 3 maanden wel eens voor dat u smeekte of huilde dat iemand u niet moest verlaten?

0 - Nooit | 1 - 1 x per 3 maanden | 2 - 2 x per 3 maanden | 3 - 3 x per 3 maanden / 1 x per maand | 4 - 4 à 5 x per 3 maanden / 1 x per 3 weken | 5 - 6 à 7 x per 3 maanden / 1 x per 2 weken | 6 - 8 à 10 x per 3 maanden / 2 x per 3 weken | 7 - 1 x per week / 11 à 15 x per 3 maanden | 8 - Meerdere malen per week, maar minder dan de helft van de week | 9 - Meer dan de helft van de week / bijna elke dag | 10 - Dagelijks

Kwam het de afgelopen 3 maanden wel eens voor dat u dreigde iets te doen om ervoor te zorgen dat iemand u niet zou verlaten?

Bijvoorbeeld chantage, leugens, moord, zelfmoord.

0 - Nooit | 1 - 1 x per 3 maanden | 2 - 2 x per 3 maanden | 3 - 3 x per 3 maanden / 1 x per maand | 4 - 4 à 5 x per 3 maanden / 1 x per 3 weken | 5 - 6 à 7 x per 3 maanden / 1 x per 2 weken | 6 - 8 à 10 x per 3 maanden / 2 x per 3 weken | 7 - 1 x per week / 11 à 15 x per 3 maanden | 8 - Meerdere malen per week, maar minder dan de helft van de week | 9 - Meer dan de helft van de week / bijna elke dag | 10 - Dagelijks

Heeft u de afgelopen 3 maanden ooit geprobeerd iemand op een fysieke manier tegen te houden als die u wilde verlaten?

Bijvoorbeeld voor de deur gaan staan, iemand vasthouden.

0 - Nooit | 1 - 1 x per 3 maanden | 2 - 2 x per 3 maanden | 3 - 3 x per 3 maanden / 1 x per maand | 4 - 4 à 5 x per 3 maanden / 1 x per 3 weken | 5 - 6 à 7 x per 3 maanden / 1 x per 2 weken | 6 - 8 à 10 x per 3 maanden / 2 x per 3 weken | 7 - 1 x per week / 11 à 15 x per 3 maanden | 8 - Meerdere malen per week, maar minder dan de helft van de week | 9 - Meer dan de helft van de week / bijna elke dag | 10 - Dagelijks

Scoring en interpretatie

Elk item wordt gescoord op een frequentieschaal van 0 (nooit) tot 10 (dagelijks of voortdurend aanwezig). De scores per DSM-criterium worden opgeteld tot een totaalscore die de algehele ernst van de stoornis aangeeft. Er zijn ook dimensiescores beschikbaar.