CPSS

Schaal voor PTSS-symptomen bij kinderen (CPSS)

De CPSS is een zelfrapportage-instrument om de ernst van symptomen van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) bij kinderen en adolescenten na een traumatische gebeurtenis te meten. Het kwantificeert zowel de aanwezigheid en de frequentie van de symptomen als de functionele impact op het dagelijks leven van het kind.

Aantal vragen	24 vragen
Geschatte duur	10 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Child PTSD Symptom Scale
Doelgroep	Kinderen, adolescenten
Auteurs	Edna B. Foa, David S. F. Raghunath, Marianne S. Davies (2001)
Categorie	PTSS, Kinderen

Voorbeeld van de 24 vragen

Hoe vaak had je in de afgelopen 2 weken last van dit probleem?

Nare gedachten of beelden over de gebeurtenis hebben die in je hoofd opkwamen terwijl je dat niet wilde

Helemaal niet of maar één keer | Eén keer per week of minder / af en toe | 2 tot 4 keer per week / de helft van de tijd | 5 keer per week of vaker / bijna altijd

Hoe vaak had je in de afgelopen 2 weken last van dit probleem?

Nare dromen of nachtmerries hebben

Helemaal niet of maar één keer | Eén keer per week of minder / af en toe | 2 tot 4 keer per week / de helft van de tijd | 5 keer per week of vaker / bijna altijd

Hoe vaak had je in de afgelopen 2 weken last van dit probleem?

Doen of je voelen alsof de gebeurtenis opnieuw gebeurde (iets horen of een beeld ervan zien en het gevoel hebben dat je er weer bent)

Helemaal niet of maar één keer | Eén keer per week of minder / af en toe | 2 tot 4 keer per week / de helft van de tijd | 5 keer per week of vaker / bijna altijd

Hoe vaak had je in de afgelopen 2 weken last van dit probleem?

Van streek raken als je eraan denkt of over de gebeurtenis hoort (bijvoorbeeld je bang, boos, verdrietig of schuldig voelen)

Helemaal niet of maar één keer | Eén keer per week of minder / af en toe | 2 tot 4 keer per week / de helft van de tijd | 5 keer per week of vaker / bijna altijd

Hoe vaak had je in de afgelopen 2 weken last van dit probleem?

Lichamelijke reacties hebben als je aan de gebeurtenis denkt of erover hoort (bijvoorbeeld gaan zweten of een snelle hartslag)

Helemaal niet of maar één keer | Eén keer per week of minder / af en toe | 2 tot 4 keer per week / de helft van de tijd | 5 keer per week of vaker / bijna altijd

Scoring en interpretatie

De totaalscore wordt verkregen door de antwoorden op de eerste 17 items op te tellen, die worden beoordeeld van 0 (helemaal niet of maar één keer) tot 3 (5 keer of vaker per week/bijna altijd), voor een bereik van 0 tot 51. De laatste 7 items meten functionele beperkingen, maar worden meestal niet in de totaalscore meegeteld. Er zijn afkapwaarden beschikbaar die de ernst van de stoornis aangeven (licht, matig, ernstig).