


Checklist voor posttraumatische-stressstoornis, specifieke versie (PCL-S)

De PCL-S wordt gebruikt voor screening op de posttraumatische-stressstoornis (PTSS). De vragenlijst werd in 1993 ontwikkeld door Weathers F.W. et al., op basis van de diagnostische criteria van de DSM-IV. Hij is afgeleid van de PCL-C (civiele versie) en de PCL-M (militaire versie), maar richt zich op één specifieke gebeurtenis.

Aantal vragen	17 vragen
Geschatte duur	4 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Posttraumatic Checklist Scale
Categorie	PTSS

Voorbeeld van de 17 vragen

Regelmatig terugkerende, onaangename herinneringen, gedachten of beelden van de stressvolle ervaring?

Helemaal niet | Een beetje | Matig | Nogal veel | Extreem veel

Regelmatig terugkerende, onaangename dromen over de stressvolle ervaring?

Helemaal niet | Een beetje | Matig | Nogal veel | Extreem veel

Opeens handelen of het gevoel hebben alsof de stressvolle ervaring opnieuw plaatsvindt (alsof u die opnieuw beleeft)?

Helemaal niet | Een beetje | Matig | Nogal veel | Extreem veel

Erg van streek raken wanneer iets u aan de stressvolle ervaring herinnert?

Helemaal niet | Een beetje | Matig | Nogal veel | Extreem veel

Lichamelijke reacties hebben (bijvoorbeeld hartkloppingen, moeite met ademhalen of zweten) wanneer iets u aan de stressvolle ervaring herinnert?

Helemaal niet | Een beetje | Matig | Nogal veel | Extreem veel

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Ik gebruik het platform inmiddels dagelijks, zo compleet, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is het.”

Julie V. - Online psycholoog