


Wywiad diagnostyczny zaburzeń lękowych i pokrewnych według DSM-5 (ADIS-5)

ADIS-5 to referencyjny częściowo ustrukturyzowany wywiad diagnostyczny stosowany przez psychologów i innych klinicystów do oceny zaburzeń lękowych i pokrewnych według kryteriów DSM-5. Pozwala na pogłębione badanie objawów, diagnozę różnicową, ocenę zaburzeń współwystępujących, unikania, subiektywnego dystresu i wpływu na funkcjonowanie. Szeroko stosowany w specjalistycznej praktyce klinicznej i w badaniach naukowych, pomaga stawiać rzetelne rozpoznania, ustalać priorytety problemów klinicznych i ukierunkować decyzje terapeutyczne. Jego modułowa budowa pozwala dostosować badanie do występujących objawów, co czyni go szczególnie przydatnym narzędziem do kompleksowej oceny zaburzeń lękowych u dorosłych.

Liczba pytań	120 pytań
Szacowany czas	90 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Timothy A. Brown, David H. Barlow (2014)
Kategoria	Lęk

Podgląd 120 pytań

Sekcja zaburzenia panicznego:

Obawa przed kolejnymi napadami

0 - Brak | 1 | 2 - Łagodne | 3 | 4 - Umiarkowane | 5 | 6 - Silne | 7 | 8 - Bardzo silne

Sekcja zaburzenia panicznego:

Unikanie sytuacji

0 - Brak | 1 | 2 - Łagodne | 3 | 4 - Umiarkowane | 5 | 6 - Silne | 7 | 8 - Bardzo silne

Sekcja zaburzenia panicznego:

Wrażliwość na doznania z wnętrza ciała / ich unikanie (interoceptywne)

0 - Brak | 1 | 2 - Łagodne | 3 | 4 - Umiarkowane | 5 | 6 - Silne | 7 | 8 - Bardzo silne

Sekcja zaburzenia panicznego:

Sygnały bezpieczeństwa

0 - Brak | 1 | 2 - Łagodne | 3 | 4 - Umiarkowane | 5 | 6 - Silne | 7 | 8 - Bardzo silne

Sekcja zaburzenia panicznego:

Odwracanie uwagi

0 - Brak | 1 | 2 - Łagodne | 3 | 4 - Umiarkowane | 5 | 6 - Silne | 7 | 8 - Bardzo silne

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Klinicysta przeprowadza częściowo ustrukturyzowany wywiad, sprawdza kryteria diagnostyczne DSM-5 dla każdego badanego zaburzenia i przypisuje kliniczną ocenę nasilenia (CSR) od 0 do 8. CSR równa 4 lub wyższa jest zwykle uznawana za wskaźnik klinicznie istotnego zaburzenia. Interpretacja opiera się na spełnieniu kryteriów, nasileniu objawów, ich przewlekłości, unikaniu, upośledzeniu funkcjonowania i zaburzeniach współwystępujących. Liczba pytań zależy od przeprowadzonych modułów.

Korzystanie

To narzędzie nie jest dostępne na platformie Mentaal. Aby korzystać z tego kwestionariusza w swojej praktyce, musisz mieć ważną licencję. Zachęcamy do wysłania go bezpośrednio ze strony wydawcy.

Przejdź na stronę wydawcy ›

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo | Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Korzystam teraz z platformy na co dzień, bo jest kompleksowa, rzetelna i wyjątkowo prosta w obsłudze.”

 Julie V. - Psycholog online