

Skale oceny ADHD u dorosłych Connersa (CAARS-2)

CAARS-2 to wystandaryzowane narzędzie oceny służące do pomiaru objawów ADHD u dorosłych według kryteriów DSM-5. Obejmuje kwestionariusze samoopisowe i kwestionariusze dla obserwatora, dostępne w wersji skróconej lub pełnej, co pozwala na szybkie badanie przesiewowe lub pogłębioną analizę. Test daje wyniki odniesione do norm, pomaga określić profile kliniczne i zawiera wskaźniki trafności wzmacniające interpretację. Łatwo włączyć go w proces oceny klinicznej lub monitorowania psychoterapii.

Liczba pytań	66 pytań
Szacowany czas	30 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Conners' Adult ADHD Rating Scales
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	C. Keith Conners, David Erhardt, Elizabeth Sparrow (1999)
Kategoria	ADHD

Podgląd 66 pytań

Lubię działać i być w ruchu.

Nigdy | Czasami | Często | Bardzo często

Gubię rzeczy potrzebne mi do różnych zajęć (klucze, dokumenty, długopisy itp.).

Nigdy | Czasami | Często | Bardzo często

Mam trudności z planowaniem z wyprzedzeniem.

Nigdy | Czasami | Często | Bardzo często

Mówię lub odpowiadam zbyt szybko, bez zastanowienia.

Nigdy | Czasami | Często | Bardzo często

Często podejmuję ryzyko lub rzucam się w niebezpieczne sytuacje.

Nigdy | Czasami | Często | Bardzo często

Obliczanie wyników i interpretacja

Każda pozycja jest oceniana na skali Likerta. Wyniki interpretuje się na podstawie norm dla populacji dorosłych, a podskale pomagają ocenić różne aspekty ADHD: nadruchliwość, impulsywność, problemy z uwagą itp.

Korzystanie

To narzędzie nie jest dostępne na platformie Mentaal. Aby korzystać z tego kwestionariusza w swojej praktyce, musisz mieć ważną licencję. Zachęcamy do wysłania go bezpośrednio ze strony wydawcy.

Przejdź na stronę wydawcy