CABI

Inwentarz zachowań dzieci i młodzieży (CABI)

CABI to kwestionariusz wypełniany przez rodziców jako obserwatorów, służący do identyfikacji i ilościowej oceny szerokiego zakresu trudności emocjonalnych, behawioralnych i funkcjonalnych u dzieci i młodzieży. Wersja 2.0 dla rodziców obejmuje 11 obszarów, które można stosować łącznie lub osobno: spowolnione tempo poznawcze, lęk, depresję, deficyt uwagi, nadruchliwość i impulsywność, zaburzenie opozycyjno-buntownicze, ograniczone emocje prospołeczne, upośledzenie funkcjonowania społecznego, odrzucenie przez rówieśników, wycofanie społeczne i trudności szkolne. Modułowa budowa, precyzyjne kotwice odpowiedzi i krótki czas wypełniania sprawiają, że jest to przydatne narzędzie w klinicznych badaniach przesiewowych, ocenie wstępnej i monitorowaniu postępów.

Liczba pytań	79 pytań
Szacowany czas	10 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Child and Adolescent Behavior Inventory
Grupa docelowa	Rodzice dzieci/nastolatków
Autorzy	G. Leonard Burns, SoYean Lee, Mateu Servera, Keith McBurnett, Stephen P. Becker (2012)
Kategoria	Adolescencja, Dzieciństwo

Podgląd 79 pytań

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca dziecko przejawiało każde z tych zachowań?

Zachowanie jest spowolnione (ospałe)

Prawie nigdy (nigdy lub około raz w miesiącu) | Rzadko (około raz w tygodniu) | Czasami (kilka razy w tygodniu) | Często (około raz dziennie) | Bardzo często (kilka razy dziennie) | Prawie zawsze (wiele razy dziennie)

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca dziecko przejawiało każde z tych zachowań?

Jest jak we mgle

Prawie nigdy (nigdy lub około raz w miesiącu) | Rzadko (około raz w tygodniu) | Czasami (kilka razy w tygodniu)

Często (około raz dziennie) | Bardzo często (kilka razy dziennie) | Prawie zawsze (wiele razy dziennie)

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca dziecko przejawiało każde z tych zachowań?

Patrzy nieobecnym wzrokiem w przestrzeń

Prawie nigdy (nigdy lub około raz w miesiącu) | Rzadko (około raz w tygodniu) | Czasami (kilka razy w tygodniu)

Często (około raz dziennie) | Bardzo często (kilka razy dziennie) | Prawie zawsze (wiele razy dziennie)

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca dziecko przejawiało każde z tych zachowań?

W ciągu dnia jest senny(-a) lub śpiący(-a) (ziewa)

Prawie nigdy (nigdy lub około raz w miesiącu) | Rzadko (około raz w tygodniu) | Czasami (kilka razy w tygodniu)

Często (około raz dziennie) | Bardzo często (kilka razy dziennie) | Prawie zawsze (wiele razy dziennie)

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca dziecko przejawiało każde z tych zachowań?

Marzy na jawie

Prawie nigdy (nigdy lub około raz w miesiącu) | Rzadko (około raz w tygodniu) | Czasami (kilka razy w tygodniu)

Często (około raz dziennie) | Bardzo często (kilka razy dziennie) | Prawie zawsze (wiele razy dziennie)

Obliczanie wyników i interpretacja

Każdą pozycję punktuje się zgodnie z kotwicą podaną w formularzu. Części od 1 do 7 punktuje się od 0 do 5. Części od 8 do 11 punktuje się od 0 do 4. Zaleca się obliczanie średniego wyniku dla każdej podskali przez podzielenie sumy punktów przez liczbę wypełnionych pozycji, co ułatwia porównywanie obszarów o różnej długości. Wyższe wyniki wskazują na większe trudności we wszystkich podskalach z wyjątkiem części 7, dotyczącej ograniczonych emocji prospołecznych, której pozycje opisują zachowania prospołeczne i dlatego należy je punktować odwrotnie, aby uzyskać wynik nasilenia. Interpretację prowadzi się podskala po podskali, z uwzględnieniem kontekstu klinicznego, zestawionych obserwacji oraz, jeśli są dostępne, norm dla wieku i płci. Kwestionariusz służy do badań przesiewowych i monitorowania, a nie do samodzielnego stawiania diagnozy.