DASH-II

Ocena diagnostyczna osób z ciężką niepełnosprawnością (DASH-II)

DASH-II to kwestionariusz do oceny psychopatologii przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Wypełnia go bliska osoba, opiekun lub specjalista, który dobrze zna osobę badaną. Narzędzie bada 13 obszarów klinicznych, w tym lęk, depresję, manię, autyzm, schizofrenię, stereotypie, samookaleczenia, zaburzenia snu, odżywiania i wydalania oraz kontrolę impulsów. W praktyce klinicznej pomaga psychologowi zidentyfikować objawy, które często trudno zwerbalizować, uporządkować wywiad, obiektywnie udokumentować częstotliwość, czas trwania i nasilenie obserwowanych zachowań, a następnie ukierunkować diagnozę i dalszą opiekę. Jest to narzędzie przesiewowe i wspierające decyzje kliniczne, a nie samo w sobie diagnoza.

Liczba pytań	84 pytania
Szacowany czas	15 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped
Grupa docelowa	Znaczna lub głęboka niepełnosprawność intelektualna
Autorzy	Johnny L. Matson, Wilkins I. Gardner, David A. Coe, Robert Sovner (1995)

Obliczanie wyników i interpretacja

Każdą pozycję ocenia się w trzech wymiarach (częstotliwość, czas trwania i nasilenie), zwykle na skali od 0 do 2, na podstawie niedawnych obserwacji osoby wypełniającej. Wyniki sumuje się w obrębie podskal. Interpretacja opiera się na punktach odcięcia właściwych dla każdego obszaru. W przypadku kilku głównych podskal identyfikacja kliniczna opiera się na wyniku częstotliwości przekraczającym referencyjny punkt odcięcia podany w podręczniku. W przypadku niektórych podskal behawioralnych wystarczy obecność co najmniej jednej pozycji ocenionej jako klinicznie istotna pod względem nasilenia, aby zasygnalizować problem wymagający dalszej oceny. Wyniki należy zestawić z wywiadem klinicznym, historią rozwoju, danymi medycznymi i kontekstem środowiskowym.