HCL-32

Lista objawów hipomanii (HCL-32)

HCL-32 to narzędzie samoopisowe przeznaczone do badania przesiewowego w kierunku objawów hipomanii u pacjentów z zaburzeniami nastroju. Jest szeroko stosowane do odróżniania zaburzenia depresyjnego jednobiegunowego od zaburzenia dwubiegunowego dzięki identyfikacji epizodów podwyższonego nastroju lub nietypowo wysokiej energii. Zapewnia ustrukturyzowany sposób zbierania subiektywnych informacji o epizodach hipomaniakalnych, przydatnych w diagnozie różnicowej.

Liczba pytań	32 pytania
Szacowany czas	10 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Hypomania Checklist-32
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Jules Angst, Thomas Meyer, Eugenia Adolfsson, Dag Ahlbom, Per Bech, Siegfried S. Gamma, Per Magni, Jules Angst (2005)
Kategoria	Zaburzenia nastroju

Podgląd 32 pytań

Proszę przypomnieć sobie okres, w którym był(a) Pan/Pani na „wyżu". W takim stanie:

Potrzebuję mniej snu.

Tak Nie

Proszę przypomnieć sobie okres, w którym był(a) Pan/Pani na „wyżu". W takim stanie:

Czuję, że mam więcej energii i aktywności.

Tak Nie

Proszę przypomnieć sobie okres, w którym był(a) Pan/Pani na „wyżu". W takim stanie:

Jestem bardziej pewny siebie.

Tak Nie

Proszę przypomnieć sobie okres, w którym był(a) Pan/Pani na „wyżu”. W takim stanie:

Praca sprawia mi większą radość.

Tak Nie

Proszę przypomnieć sobie okres, w którym był(a) Pan/Pani na „wyżu”. W takim stanie:

Mam więcej kontaktów społecznych (więcej dzwonię, więcej wychodzę).

Tak Nie

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Pacjent samodzielnie zaznacza przy każdej pozycji „tak” lub „nie” w zależności od tego, czy doświadczył danego objawu w „okresie największej energii”. Wynik ogólny oblicza się, sumując odpowiedzi twierdzące. Wysoki wynik (zwykle >14 lub >12 w zależności od badania) sugeruje możliwe występowanie zaburzenia dwubiegunowego, ale ostateczna interpretacja należy do klinicysty, który uwzględnia cały kontekst.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Rzetelna i trafna ocena, dzięki której lepiej rozumiem stan psychiczny moich pacjentów”

Benjamin G. - Psycholog pracy