OII

Inwentarz intruzji obsesyjnych (OII)

Inwentarz intruzji obsesyjnych ocenia częstotliwość natrętnych myśli obsesyjnych u dorosłych, wywoływany przez nie dyskomfort oraz postrzeganą kontrolę nad nimi. Pomaga ocenić natrętny charakter niektórych treści psychicznych, często spotykanych w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym (OCD) oraz w populacji ogólnej. Narzędzie zawiera stwierdzenia obejmujące różne tematy intruzji obsesyjnych. Może pomóc odróżnić intruzje normalne od patologicznych.

Liczba pytań	52 pytania
Szacowany czas	15 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Obsessive Intrusions Inventory
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Jane F. Purdon, Mark H. Clark (1993)
Kategoria	OCD

Podgląd 52 pytań

Jak często pojawiała się u Pana/Pani ta natrętna myśl, obraz lub impuls?

Wjechanie samochodem w szybę wystawową

0 - Nigdy nie miałem(-am) takiej myśli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Mam tę myśl często w ciągu dnia

Jak często pojawiała się u Pana/Pani ta natrętna myśl, obraz lub impuls?

Zjechanie samochodem z drogi

0 - Nigdy nie miałem(-am) takiej myśli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Mam tę myśl często w ciągu dnia

Jak często pojawiała się u Pana/Pani ta natrętna myśl, obraz lub impuls?

Potrącenie samochodem zwierzęcia lub człowieka

0 - Nigdy nie miałem(-am) takiej myśli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Mam tę myśl często w ciągu dnia

Jak często pojawiała się u Pana/Pani ta natrętna myśl, obraz lub impuls?

Odbicie kierownicą w stronę innych pojazdów

0 - Nigdy nie miałem(-am) takiej myśli	1	2	3	4	5	6 - Mam tę myśl często w ciągu dnia

Jak często pojawiała się u Pana/Pani ta natrętna myśl, obraz lub impuls?

Uderzenie z impetem w jakiś obiekt

0 - Nigdy nie miałem(-am) takiej myśli	1	2	3	4	5	6 - Mam tę myśl często w ciągu dnia

Obliczanie wyników i interpretacja

Każde pytanie ocenia się na skali częstotliwości (od „nigdy” do „bardzo często”), odczuwanego dyskomfortu (od „brak” do „skrajny”) i trudności w kontrolowaniu (od „brak” do „skrajna”). Punkty sumuje się, aby uzyskać ogólną miarę częstotliwości i wpływu intruzji obsesyjnych. Punkty odcięcia pozwalają wyróżnić profile kliniczne.