

Skala zespołu pozytywnego i negatywnego (PANSS)

PANSS to narzędzie oceny klinicznej służące do pomiaru nasilenia objawów pozytywnych i negatywnych u pacjentów ze schizofrenią. Obejmuje też ocenę objawów ogólnych towarzyszących zaburzeniu. Klinicysta ocenia każdą pozycję na skali od 1 do 7 na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu klinicznego i bezpośredniej obserwacji.

Liczba pytań	30 pytań
Szacowany czas	45 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Positive and Negative Syndrome Scale
Grupa docelowa	Dorośli ze schizofrenią
Autorzy	Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein, Lewis A. Opler (1987)

Podgląd 30 pytań

P1. Urojenia

1 - Brak objawu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - Nasilenie skrajnie ciężkie

P2. Dezorganizacja pojęciowa

1 - Brak objawu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - Nasilenie skrajnie ciężkie

P3. Zachowania omamowe

1 - Brak objawu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - Nasilenie skrajnie ciężkie

N1. Spłycenie afektu

1 - Brak objawu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - Nasilenie skrajnie ciężkie

N4. Bierność/apatia, społeczne wycofanie

1 - Brak objawu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - Nasilenie skrajnie ciężkie

Obliczanie wyników i interpretacja

Każda pozycja jest oceniana od 1 (brak) do 7 (skrajne nasilenie). Wyniki trzech podskal (pozytywnej, negatywnej i ogólnej) uzyskuje się, sumując punkty odpowiednich pozycji. Wyniki ogólne pozwalają oszacować całkowite nasilenie zaburzenia oraz proporcję między objawami pozytywnymi a negatywnymi.

Korzystanie

To narzędzie nie jest dostępne na platformie Mentaal. Aby uzyskać dostęp do tego kwestionariusza, odwiedź stronę oficjalnego dystrybutora, Mapi Research Trust, i złóż wniosek w serwisie ePROVIDE™

Przejdź do ePROVIDE™