PAS-SR

Kwestionariusz samoopisowy spektrum lęku panicznego i agorafobii (PAS-SR)

PAS-SR to kwestionariusz samoopisowy przeznaczony do szerokiego badania spektrum paniczno-agorafobicznego u dorosłych. Nie ogranicza się do kategorialnych kryteriów zaburzenia panicznego lub agorafobii, lecz rejestruje także przejawy subkliniczne, nietypowe, temperamentalne i towarzyszące, występujące w ciągu całego życia. Narzędzie jest przydatne w klinicznej identyfikacji wymiarów lęku związanych ze spektrum paniczno-agorafobicznym, w badaniu współwystępowania zaburzeń, zwłaszcza z zaburzeniami nastroju, oraz w doprecyzowaniu profilu objawów wykraczającego poza ścisłe rozpoznanie według DSM. Może pomóc psychologowi obiektywnie ocenić obciążenie objawami w ciągu życia, uporządkować wywiad kliniczny i zidentyfikować często niedoceniane obszary podatności.

Liczba pytań	114 pytań
Szacowany czas	20 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Panic-Agoraphobic Spectrum Self-Report
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Giovanni B. Cassano, Ellen Frank, Katherine M. Shear, Paola Rucci (1999)
Kategoria	Zaburzenie paniczne

Podgląd 114 pytań

Czy w dzieciństwie lub w dorosłym życiu kiedykolwiek odczuwał(a) Pan/Pani silny niepokój...

...gdy był(a) Pan/Pani z dala od domu lub bliskich albo spodziewał(a) się takiej rozłąki (na przykład gdy miał(a) Pan/Pani zatrzymać się u krewnych lub w innym miejscu)?

Tak Nie

Czy w dzieciństwie lub w dorosłym życiu kiedykolwiek odczuwał(a) Pan/Pani silny niepokój...

...z powodu myśli, że może Pan/Pani stracić kogoś bliskiego albo że może mu się stać krzywda (na przykład czy bardzo się Pan/Pani martwił(a), gdy rodzice się kłócili albo gdy jedno z nich chorowało)?

Tak Nie

Czy kiedykolwiek bardzo się Pan/Pani martwił(a), że przytrafi się Panu/Pani coś złego, co doprowadzi do rozłąki z kimś bliskim (na przykład że się Pan/Pani zgubi lub zostanie porwany(-a))?

Tak Nie

Czy kiedykolwiek miał(a) Pan/Pani trudności z chodzeniem do szkoły lub do pracy z powodu lęku przed rozłąką?

Tak Nie

Czy bardzo trudno było Panu/Pani być samemu (samej) lub bez kogoś bliskiego, w domu lub w innych miejscach?

Tak Nie

Obliczanie wyników i interpretacja

Pozycje są zwykle punktowane w formie dychotomicznej: 1 punkt za każdą odpowiedź twierdzącą i 0 za każdą przeczącą. Wynik ogólny to suma odpowiedzi twierdzących; można też obliczyć wyniki w poszczególnych obszarach. Wysoki wynik wskazuje na szersze i wyraźniejsze występowanie cech spektrum paniczno-agorafobicznego w ciągu życia. Interpretacja ma charakter wymiarowy: w rutynowej praktyce klinicznej nie stosuje się powszechnie diagnostycznego punktu odcięcia, a wyniki należy zestawiać z wywiadem klinicznym i kontekstem psychopatologicznym.