

Lista kontrolna zespołu stresu pourazowego (wersja dla konkretnego zdarzenia) (PCL-S)

PCL-S służy do badania przesiewowego w kierunku zespołu stresu pourazowego (PTSD). Opracowali ją w 1993 roku Weathers F.W. i wsp. na podstawie kryteriów diagnostycznych DSM-IV. Wywodzi się z PCL-C (wersji cywilnej) i PCL-M (wersji wojskowej), ale dotyczy konkretnego zdarzenia.

Liczba pytań	17 pytań
Szacowany czas	4 minuty
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Posttraumatic Checklist Scale
Kategoria	PTSD

Podgląd 17 pytań

Powtarzające się, niepokojące wspomnienia, myśli lub obrazy stresującego doświadczenia

Wcale | Trochę | Umiarkowanie | Znacznie | Bardzo silnie

Powtarzające się, niepokojące sny o stresującym doświadczeniu

Wcale | Trochę | Umiarkowanie | Znacznie | Bardzo silnie

Nagłe zachowanie lub poczucie, jakby stresujące doświadczenie działo się ponownie (jakby przeżywał(a) je Pan/Pani na nowo)

Wcale | Trochę | Umiarkowanie | Znacznie | Bardzo silnie

Silne zdenerwowanie, kiedy coś przypominało Panu/Pani o stresującym doświadczeniu

Wcale | Trochę | Umiarkowanie | Znacznie | Bardzo silnie

Reakcje fizyczne (np. kołatanie serca, trudności z oddychaniem lub pocenie się), kiedy coś przypominało Panu/Pani o stresującym doświadczeniu

Wcale | Trochę | Umiarkowanie | Znacznie | Bardzo silnie

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo | Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Mentaal stał się dla mnie niezastąpionym sprzymierzeńcem, który pomaga uporządkować proces oceny i pogłębić kliniczne rozumienie moich pacjentów.”

Nolwenn P. - Psycholog CBT