


Skala diagnostyczna autyzmu i zespołu Aspergera Ritvo (RAADS-R)

RAADS-R to skala przesiewowa wspierająca diagnozę autyzmu u dorosłych, zwłaszcza u osób z objawami odpowiadającymi zespołowi Aspergera lub wysokofunkcjonującym zaburzeniom ze spektrum autyzmu. Służy do identyfikacji trudności w obszarze interakcji społecznych, komunikacji, ograniczonych zainteresowań i nietypowych zachowań sensorycznych.

Liczba pytań	80 pytań
Szacowany czas	20 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Riva Ariella Ritvo, Edward Ritvo, Thomas J. Guthrie, Irene S. Ritvo (2011)
Kategoria	Spektrum autyzmu

Podgląd 80 pytań

Uważam się za osobę empatyczną.

Prawda teraz i w młodości | Prawda tylko teraz | Prawda tylko przed ukończeniem 16 lat | Nigdy nie było prawdą

W rozmowie często używam słów lub wyrażeń zapamiętanych z filmów, seriali lub telewizji.

Prawda teraz i w młodości | Prawda tylko teraz | Prawda tylko przed ukończeniem 16 lat | Nigdy nie było prawdą

Często jestem zaskoczony(-a), gdy inni mówią mi, że moje zachowanie mogło wydawać się niegrzeczne.

Prawda teraz i w młodości | Prawda tylko teraz | Prawda tylko przed ukończeniem 16 lat | Nigdy nie było prawdą

Czasami mówię za głośno lub za cicho, nie zdając sobie z tego sprawy.

Prawda teraz i w młodości | Prawda tylko teraz | Prawda tylko przed ukończeniem 16 lat | Nigdy nie było prawdą

Często trudno mi wiedzieć, jak się zachować w sytuacjach towarzyskich.

Prawda teraz i w młodości | Prawda tylko teraz | Prawda tylko przed ukończeniem 16 lat | Nigdy nie było prawdą

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Punktacja Każdą pozycję punktuje się od 0 do 3: „Prawda teraz i gdy byłem(-am) młody(-a)" = 3, „Prawda tylko teraz" = 2, „Prawda tylko przed 16. rokiem życia" = 1, „Nigdy nieprawda" = 0. 17 pozycji sformułowanych w kierunku typowego funkcjonowania (1, 6, 11, 18, 23, 26, 33, 37, 43, 47, 48, 53, 58, 62, 68, 72, 77) punktuje się odwrotnie.

Wynik całkowity mieści się w zakresie od 0 do 240 i dzieli się na cztery podskale:

- Relacje społeczne: 39 pozycji, od 0 do 117
- Ograniczone zainteresowania: 14 pozycji, od 0 do 42
- Język: 7 pozycji, od 0 do 21
- Sensoryka i motoryka: 20 pozycji, od 0 do 60

Interpretacja wyniku całkowitego

- Poniżej 65: na ogół niezgodny z autyzmem
- Od 65 do 105: pewne cechy autystyczne, bez poziomu jednoznacznie zgodnego z autyzmem
- Od 106 do 139: na ogół zgodny z autyzmem; wskazana pogłębiona diagnoza
- 140 i więcej: wyraźne cechy autystyczne; wskazana pogłębiona diagnoza

Pochodzenie punktów odcięcia

- 65 to punkt odcięcia z oryginalnego badania walidacyjnego (Ritvo i in., 2011: 201 dorosłych osób autystycznych, 578 dorosłych osób nieautystycznych).
- 106 i 140 pochodzą z rewizji NovoPsych (Hegarty i in., 2025). Wyznaczono je za pomocą analizy ROC na próbie 37 620 osób, które wypełniły RAADS-R i AQ, przyjmując jako kryterium punkty odcięcia AQ (26 i 36), a nie diagnozę kliniczną. Opracowanie to jest raportem technicznym, nieopublikowanym w recenzowanym czasopiśmie.
- Punkty odcięcia dla podskal pochodzą z tej samej rewizji (wynik zgodny / wyraźny): relacje społeczne 49 / 64, ograniczone zainteresowania 20 / 28, język 8 / 11, sensoryka i motoryka 26 / 38. Są one dopasowane do centyli wyniku całkowitego i nie zostały odrębnie zwalidowane.
- Wszystkie te punkty odcięcia wyznaczono na wersji angielskiej. Żaden z nich nie pochodzi z walidacji francuskojęzycznej.

Tłumaczenie Udostępniona wersja jest tłumaczeniem oryginalnej skali Ritvo i in. (2011). Nie została zwalidowana.

Ograniczenia Punkt odcięcia 65 daje wiele wyników fałszywie dodatnich w populacjach klinicznych: przekracza go 81,5% próby klinicznej NovoPsych, francuska walidacja (Picot i in., 2021) wskazuje 55,6% wyników fałszywie dodatnich wśród dorosłych z innymi zaburzeniami psychicznymi, a badanie dorosłych skierowanych z podejrzeniem ASD (Jones i in., 2021) wykazuje bardzo niską swoistość. To właśnie skłoniło do przyjęcia wyższych punktów odcięcia NovoPsych. Wysoki wynik

wskazuje, że pogłębiona diagnoza jest zasadna, ale sam nie stanowi diagnozy. I odwrotnie, osoba, która silnie kompensuje lub maskuje swoje cechy, może uzyskać niski wynik.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo

Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Mentaal stał się dla mnie niezastąpionym sprzymierzeńcem, który pomaga uporządkować proces oceny i pogłębić kliniczne rozumienie moich pacjentów.”

 Joanna P. - Psycholog CBT