SANS

Skala oceny objawów negatywnych (SANS)

SANS to skala wypełniana przez klinicystę, służąca do pomiaru nasilenia objawów negatywnych w schizofrenii i, szerzej, u pacjentów z zaburzeniem psychotycznym. Narzędzie bada pięć obszarów klinicznych: spłycenie afektu, alogię, abulię lub apatię, anhedonię lub aspołeczność oraz uwagę. Jest przydatne przede wszystkim w ocenie wstępnej, monitorowaniu klinicznym i w badaniach.

Liczba pytań	25 pytań
Szacowany czas	30 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Scale for the Assessment of Negative Symptoms
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Nancy C. Andreasen (1983)
Kategoria	Zaburzenia psychotyczne

Podgląd 25 pytań

Spłycenie lub stępienie afektu

Niezmieniający się wyraz twarzy

0 - Brak | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Znaczne | 5 - Ciężkie

Spłycenie lub stępienie afektu

Zmniejszenie ruchów spontanicznych

0 - Brak | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Znaczne | 5 - Ciężkie

Spłycenie lub stępienie afektu

Ubóstwo gestów ekspresyjnych

0 - Brak | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Znaczne | 5 - Ciężkie

Spłycenie lub stępienie afektu

Słaby kontakt wzrokowy

0 - Brak | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Znaczne | 5 - Ciężkie

Spłycenie lub stępienie afektu

Brak odpowiedzi afektywnej

0 - Brak | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Znaczne | 5 - Ciężkie

Obliczanie wyników i interpretacja

Każdą pozycję klinicysta ocenia od 0 do 5, od „brak” do „ciężkie nasilenie”, z możliwością oznaczenia pozycji jako niemożliwej do oceny w razie braku informacji. 25 ocen obejmuje szczegółowe pozycje oraz oceny globalne dla każdego z pięciu obszarów. Ocena opiera się na wywiadzie klinicznym i obserwacji zachowania w ciągu ostatnich 30 dni. Im wyższy wynik, tym bardziej nasilona symptomatologia negatywna. W praktyce interpretacja opiera się głównie na profilu obszarów i ocenach globalnych, ponieważ nie istnieją uniwersalne progi nasilenia mające zastosowanie we wszystkich kontekstach.