TSC-40

Lista kontrolna objawów traumy (TSC-40)

TSC-40 to kwestionariusz samoopisowy dla dorosłych, złożony z 40 pozycji. Służy do określenia nasilenia objawów często związanych z traumą przeżytą w dzieciństwie lub w dorosłości. Bada sześć obszarów klinicznych: lęk, depresję, dysocjację, wskaźnik traumy wykorzystania seksualnego, problemy seksualne i zaburzenia snu. Narzędzie jest stosowane głównie w badaniach naukowych i jako miara uzupełniająca w ocenie klinicznej; dostarcza wyniku ogólnego cierpienia związanego z traumą i samo nie stanowi pełnego narzędzia do diagnozowania PTSD.

Liczba pytań	40 pytań
Szacowany czas	12 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Trauma Symptom Checklist
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	John Briere, Marsha Runtz (1992)
Kategoria	PTSD

Podgląd 40 pytań

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca doświadczał(a) Pan/Pani każdego z następujących objawów?

Bóle głowy

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 - Często

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca doświadczał(a) Pan/Pani każdego z następujących objawów?

Bezsenność

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 - Często

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca doświadczał(a) Pan/Pani każdego z następujących objawów?

Utrata masy ciała (bez stosowania diety)

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 - Często

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca doświadczał(a) Pan/Pani każdego z następujących objawów?

Problemy z żołądkiem

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 - Często

Jak często w ciągu ostatniego miesiąca doświadczał(a) Pan/Pani każdego z następujących objawów?

Problemy seksualne

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 - Często

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Każdą pozycję ocenia się od 0 do 3 w zależności od częstotliwości objawu. Wynik ogólny to suma 40 pozycji, w zakresie od 0 do 120. Podskale oblicza się, sumując następujące pozycje: dysocjacja 7, 14, 16, 25, 31, 38; lęk 1, 4, 10, 16, 21, 27, 32, 34, 39; depresja 2, 3, 9, 15, 19, 20, 26, 33, 37; SATI (wskaźnik traumy wykorzystania seksualnego) 5, 7, 13, 21, 25, 29, 31; zaburzenia snu 2, 8, 13, 19, 22, 28; problemy seksualne 5, 9, 11, 17, 23, 29, 35, 40. Wyższe wyniki wskazują na bardziej nasilone objawy traumy. Interpretacja jest wymiarowa i koncentruje się na wyniku ogólnym, profilu podskal i kontekście klinicznym; nie ma powszechnie ustalonego klinicznego punktu odcięcia o wartości diagnostycznej.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo | Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Korzystam teraz z platformy na co dzień, bo jest kompleksowa, rzetelna i wyjątkowo prosta w obsłudze.”

Julie V. - Psycholog online